Проби от диви



за изследване за:

- Африканска чума по свинете
- Класическа чума по свинете
- Шап
- Трихинелоза

Отдел „Здравеопазване на животните“,
Областна дирекция по безопасност на храните,
гр. Габрово

13.5.2019 г.

“Once you pull the trigger, the fun stops and the work begins”

(„Веднъж дръпнал спусъка, забавлението свършва и започва работата“)



Проби за Африканска и Класическа чуми по дивите свине










Отделяне на мандибуларния
лимфен възел


Начин за вземане на проби от далака,
бъбреците, мезентериалният лимфен възел


Далак (виж
стрелката)


Вземане на проба от далака










Вземане на мезентериалния лимфен възел




224






Вземане на кръвни проби
Епруветка за кръв

Кръвна проба

Лоша проба



Добра проба





1. Кръв
2. Сливици
3. Мандибуларен лимфен възел
4. Мезентериален лимфен възел
5. Парче далак
6. Бъбрек

Демонстрационната дисекция и събирането на проби е проведена в незаразен район. В заразен район дисекцията трябва да бъде извършена върху непромокаема насмолена мушама (от изключително значение за поддържане на чистота и дезинфекция), за да се избегне разпространението на вируси!



Проби за АЧС, КЧС се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе!

В случай на намерен разложен труп на дива свиня се взима **тръбна кост**, която се изследва за АЧС, КЧС





Качетата на диафрагмата за изследване за трихинелоза





Проби за трихинелоза се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе!

Проби за шап

- Кръвни проби
- Органни проби – сливици и глътка
- Крака, език, рило при изменения





Проби за шап се взимат единствено при съмнение или след инструкции от БАБХ за надзор на болестта в определени райони!

Пълната проба за всяко едно отстреляно диво прасе



Кръв
Сливици
Лимфни възли
Парче далак
Бъбрек

→ Официален ветеринарен лекар → Референтна лаборатория за АЧС, КЧС



Диафрагма → Оторизирана лаборатория за изследване за трихинелоза

Месото се съхранява до излизане на лабораторния резултат!

Необходима информация която да придружава пробите

- Дата на отстрел
- Място на отстрел
- ЛРД, ловец извършил отстрела
- Приблизителна възраст на дивото прасе
- Пол
- Забелязани отклонения от нормалния вид на вътрешните органи, поведение на дивеча и т.н.



Място на отстрел на диви свине от които са взети проби за изследване за КЧС през 2015 г.



Благодаря за вниманието