Въпроси свързани с фуражите

1. **Заключение прието на Постоянния комитет за растенията, животните, храните и фуражите, секция „Хранене на жинотните“ на 14.12.2021 относно етиленовия оксид и холин хлорида**

„Наличието на 2-хлороетанол в холин хлорида не е резултат от незаконна употреба на етиленов оксид като дезинфектант/биоцид, а в резултат на неизбежно замърсяване на производствения процес след използването на етиленов оксид и солна киселина като изходни материали.

Въз основа на информацията, съдържаща се в становището на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) относно холин хлорида от 2011 г., в което се посочва, че холин хлоридът (75 % чистота) е без съдържание на етиленов оксид и че 2-хлороетанолът може да присъства в нива от 10 до 55 mg/kg, максимално ниво от ETOsum (сума от етиленов оксид и 2-хлороетанол, изразен като етилен оксид) в холин хлорида от 40 mg/kg(*), отнасящо се за холин хлорид с 99 % чистота, трябва да се прилага за принудително изпълнение в рамките на управлението на този инцидент.

Въз основа на нивата на употреба на холин хлорид, нивото в кобинирания/пълноценния фураж може да надвиши нивото от 0,02 mg/kg (LOQ). Комбинираните/пълноценните фуражи, надвишаващи нивото от 0,02 mg/kg, не трябва да се изтеглят от пазара при условие, че фракцията на ETOsum над 0,02 mg/kg може да се дължи на употребата на холин хлорид с максимално ниво от 40 mg/kg (отнасящо се до холин хлорид с 99% чистота).

(*) *40 mg/kg е 55 mg/kg x 0,55 x 1,32, при което 0,55 е факторът, използван за изразяване на 2-хлороетанол в еквиваленти на етилен оксид и 1,32 (99/75) е коефициентът, използван за изразяване на максималното ниво по отношение на холин хлорид с 99 % чистота.“*

2. Премикси

- премикси

Премиксите предимно са смес от фуражни добавки с носител.

(Съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1831/2003 „премикси“ означава смеси от фуражни добавки или смеси от една или повече фуражни добавки с фуражни суровини или вода, използвани като носители, които не са предназначени за директно хранене на животните;)

Тъй като нивото от 0,1 mg/kg ETOsum (т.е. сумата от етиленов оксид и 2-хлороетанол, изразени като етиленоксид) е приложимо за фуражните добавки, позицията на службите на Комисията е, че е приложимо и нивото от 0,1 mg/kg към премикси. За комбинираните фуражи, в които са използвани премиксите, е приложимо ниво от 0,02 mg/kg (освен ако не е използван холин хлорид).

Приложимото максимално ниво за ETOsum в премиксите според службите на Комисията е следното:

- **Премикси, в които не е вложен холин хлорид**: максималното ниво е 0.1 mg/kg ETOsum

- **Премикси, в които е вложен холин хлорид**: премикс, надвишаващ нивото от 0,1 mg/kg ETOsum, не трябва да се изтегля от пазара при условие, че фракцията на ETOsum над 0,1 mg/kg може да се дължи на присъствието в премикса на холин хлорид с максимално ниво от 40 mg /kg (за холин хлорид с 99 % чистота)

- **комбинирани фуражи с вложен премикс, в който не е вложен холин хлорид**: прилага се максимално ниво от 0.02 mg/kg ETOsum

- комбинирани фуражи с вложен премикс, в който е вложен холин хлорид: комбиниран фураж, надвишаващ нивото от 0,02 mg/kg ETOsum, не трябва да се изтегля от пазара при условие, че фракцията на ETOsum над 0,02 mg/kg може да се дължи на използването на холин хлорид с максимално ниво от 40 mg/kg (за холин хлорид с 99 % чистота)

Неофициалният превод е извършен от дирекция "Контрол на фуражите и страничните жвотински продукти"

София, 24.01.2022 г.