РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-2728/16.11.2023 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 67, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 4817/06.11.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. №№ 3198/13.02.2023 г., 4074/24.02.2023 г. и 11906/20.06.2023 г. от Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия, с упълномощен представител АДАМА България ЕООД и Писмо с вх. № 19860/12.10.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание: 5/31.01.2023 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**, с притежател на разрешението – Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия, както следва:

1.1. На първа страница в частта „**Активно/и вещество/а: Производител/и**:“ текста „АДАМА Ирвита Н.Вр. Кюрасао/ADAMA Irvita N.V. Curaçao“ се заменя с текста „АДАМА Мактешим Лтд./ADAMA Makhteshim Ltd., Израел“.

1.2. На първа страница в частта „**Производител**“ текста „**АДАМА Ирвита Н.Вр. Кюрасао/ADAMA Irvita N.V. Curaçao**“ се заменя с текста „**АДАМА Мактешим Лтд./ADAMA Makhteshim Ltd., Израел**“.

Мотиви по т. 1.1 и 1.2:

Със Заявление с вх. № 11906/20.06.2023 г. Адама Агрикалчър БВ заявява изменение на **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание: 5/31.01.2023 г.,** като бъдат променени производителя на активното вещество и на продукта.

С Писмо с вх. № 11906/20.06.2023 г. от АДАМА България ЕООД се посочват мотивите и основанията за горепосоченото изменение и се предоставя актуализирана част С на регистрационен доклад.

1.3. На втора страница частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с **Приложение № 1** на настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3:

Със Заявление с вх. № 4074/24.02.2023 г. от АДАМА Агрикалчър БВ се заявява изменение на **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание: 5/31.01.2023 г.**, като бъдат разрешени допълнителни употреби на продукта.

Заявеното изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 19860/12.10.2023 г.

1.4. Добавя се част „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ съгласно **Приложение № 2** на настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.4:

Със Заявление с вх. № 3198/13.02.2023 г от АДАМА Агрикалчър БВ се заявява изменение на **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание: 5/31.01.2023 г.**, като бъдат разрешени допълнителни минимални употреби на продукта.

Заявеното изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 19860/12.10.2023 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита по т. 1 да се преиздаде.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание: 5/31.01.2023 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-2728/16.11.2023 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**
Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
Концентрация на активно/и вещество/а: тау-флувалинат – 240 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Пшеница	П	Вредна житна дървеница (*Eurogaster integriceps*), обикновена житна пиявица, (*Oulema melanopus*), овесена листна въшка (*Sitobion avenae*), брястова листна въшка (*Rhopalosiphum padi*), шеничена галица (*Contarinia tritici*),	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-75 (начало на братене – средата на млечна зрелост)	2	10-14	20 мл/дка	20-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	30	

			галица (*Sitodiplosis mosellana)*, житна цикада (*Psammotettix alienus*), остроглава житна дървеница (*Aelia rostrata*), мавърска житна дървеница (*Eurygaster maura*)									
2	Ечемик, овес, ръж, тритикале	П	Овесена листна въшка *(Sitobion avenae)*, брястова листна въшка *(Rhopalosiphum padi)*, пшеничена галица *(Contarinia tritici)*, галица *(Sitodiplosis mosellana)*, житна цикада *(Psammotettix alienus)*, остроглава житна дървеница *(Aelia rostrata)*, мавърска житна дървеница *(Eurygaster maura)*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-75 (първи лист от колеоптила - средата на млечна зрялост)	2	14	20 мл/дка	10-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	30	
3	Маслодайна рапица (зимна и пролетна)	П	Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*) Рапичен стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus napi*) Рапична стъблена бълха (*Psylliodes chrysocephala*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-54 (разтворен трети лист – видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (основно цветообразуване))	2	14	20 мл/дка	10-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	30	

			Зелева листна въшка (*Brevicoryne brassicae*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*)		Зимна маслодайна рапица: ВВСН 10-57 (напълно оформени котиледони-видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразува-не)) Пролетна маслодайна рапица: ВВСН 31-57 (видимо нарастване на първо междувъзлие-видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразува-не))				20-40 л/дка			
4	Захарно цвекло	П	Черна бобова листна въшка *(Aphis fabae*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-39 (разлистени 5 листа – листата покриват 90% от повърхността)	2	14	20 мл/дка	20-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	14	

5	Фасул, бакла и грах (зелени без шушулки)	П	Зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum*), черна бобова листна въшка (*Aphis fabae*), трипс (*Thrips angusticeps*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*), грахова листозавивачка (*Cydia nigricana*), грахова галица (*Contarinia pisi*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	. .

6	Зрял фасул, леща, нахут, посевно секирче (*Lathyrus sativus*) и грах (варива)	П	Зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum*), черна бобова листна въшка (*Aphis fabae*), трипс (*Thrips angusticeps*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*), грахова листозавивачка (*Cydia nigricana*), грахова галица (*Contarinia pisi*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 09-85 (пониквaне - 50% от чушките са узрели, зърната са твърди)	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	14	
7	Моркови, червено цвекло	П	*Cavariella aegopodii*, зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), *Semiaphis dauci*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 10-49 за моркови: (котиледоните напълно разтворени; точката на нарастване или първи несъщински лист видими - край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер) за червено цвекло: (видими първите листа (като глава на топлийка):котиле-доните са хоризонтално разтворени-кореноплодите са	2	14	30 мл/дка	15-40 л/дка	7,2 г а.в./дка	14	

					в техническа зрялост)							
8	Артишок, кардун	П	Листни въшки (*Aphis fabae, Aphis solanella, Capitophorus horni, Brachycaudus cardui*), трипси *(Thrips sp.),* нощенки (*Spodoptera* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-49 (пет листа разтворени – достигане на крайния размер на подлежащите за прибиране продуктови части)	2	14	30 мл/дка	10-40 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	
9	Карфиол, главесто зеле и брюкселско зеле	П	Зелева листна въшка (*Brevicoryne brassicae*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), трипси *(Thrips sp.),* бели зелеви пеперуди (*Pieris* sp.), зелева нощенка (*Mamestra brassicae*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени - типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)	1	-	30 мл/дка	10-50 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	
10	Маруля и други подобни, бейби маруля, ендивия	П	Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Nasonovia ribisnigri, Uroleucon cichorii*),	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-41 (разтворен втори същински лист-образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета)	2	14	40 мл/дка	30-50 л/дка	9,6 г а.в./дка	14	

11	Патладжан	П	Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Macrosiphum* sp.),	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-75 (трети същински лист - пети плод с типичен размер и форма)	2	14	20 мл/дка	15-50 л/дка	4,8 г а.в./дка	3	
12	Краставици, корнишони, тиквички	П	Памукова листна въшка (Aphis gossypii) зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Macrosiphum* sp.), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-84 (пети лист разтворен – 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2	14	20 мл/дка	20-100 л/дка	4,8 г а.в./дка	7	
13	Пъпеш	П	Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Macrosiphum* sp.), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	
14	Ябълка, круша, дюля, мушмула	П	Плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), кафява мраморна дървеница	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 52-59 (край на набъбването – повечето цветове с венчелистчетата	2	14	20-60 мл/дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	

			(*Halyomorpha halys*),		оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване – размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)							
			ябълково-живовлекова листна въшка *(Dysaphis plantaginea)*, зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi)*, *Contarinia pyrivora*, *Dasineura pyri*		BBCH 00/01-59 (покой/начало на набъбване на листните пъпки – повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване – размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)							
15	Праскова, кайсия, нектарина	П	Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*), източен плодов червей (*Cydia molesta*), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis)*, трипси (*Thrips* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 53-59 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори – повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчици (бял бутон))	2	14	20-60 мл/дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	40-120 мл продукт /100 л вода

					BBCH 71-73 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – вторично окапване на завръза)							
			Листни въшки *(Hyalopterus amygdali, Myzus persicae, Brachycaudus persicae)*		BBCH 01-59 (начало на събуждането (набъбването) на пъпките - повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчици (бял бутон))) BBCH 71-73 (разрастване на яйчниа; окапване на завръзи след цъфтежа – вторично окапване на завръза)							
16	Лозя (трапезни и винени сортове)	П	Лозова цикада (*Empoasca vitis)*, американска лозова цикада (*Scaphoideus titanus*), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis)*, лозов трипс (*Drepanothrips reuteri*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 53-79 (съцветията се виждат изцяло - повечето от зърната се събират, грозда се затваря)	2	14	30 мл/дка	10-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	21	30-300 мл продукт /100 л вода

17	Люцерна	П	Грахова листна въшка *(Acyrthosiphon pisum)*, черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)*, малък люцернов листен хоботник *(Hypera postica)*, ивичест грудков хоботник *(Sitona lineatus)*, детелинов хоботник *(Apion pisi)*, люцернов листояд *(Phytodecta fornicata)*, жълт люцернов тихиус *(Tychius flavus)*,	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-72 (разлистени 2 листа - 20% от шушлките са достигнали крайна дължина)	2	14	30 мл/дка	20-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	Да не се прилага по време на цъфтеж
18	Цитрусови култури	П	Листни въшки (*Aphis sp., Toxoptera aurantii)* цитрусов молец *(Prays citri*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 01-59 (начало на набъбване на цветните пъпки– повечето цветове формират топчица)	2	14	40 мл/дка	100-200 л/дка	9,6 г а.в./дка	30	20-40 мл продукт /100 л вода
19	Череши	П	Черешова муха (*Rhagoletis cerasi*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 71-81 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – начало на оцветяване)	1-2	14	20-25 мл/дка	100 л/дка	4,8 – 6 г а.в./дка	14	Не повече от две третирания за вегетационен сезон

			Ябълков златист хоботник ***(****Rhynchites bacchus)*		ВВСН 15-39 (5 листа разтворени-леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина)	1		25 мл/дка		6 г а. в. /дка		
20	Слънчоглед	П	Малка сливова листна въшка *(Brachycaudus helichrysi)*	Конвен-ционална наземна техника	При поява на неприятеля	2	14	20 мл/дка	15-40 л/дка	4,8 г а. в./дка	60	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Recoverable Signature

X РД11-2728/16.11.2023 г.

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**
Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
Концентрация на активно/и вещество/а: тау-флувалинат – 240 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Фасул, бакла, грах (зелени, без шушулки)	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	

					с ограничен цъфтежен период)) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)							
2	Зрял фасул, нахут, посевно секирче (*Lathyrus sativus*), грах (варива)	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	14	
3	Компасна салата, ескарол, манголд	П	Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Nasonovia ribisnigri, Uroleucon cichorii*), трипси *(Thrips* sp.), растителноядни	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	2	14	40 мл/дка	30-50 л/дка	9,6 г а.в./дка	14	

			дървеници (*Lygus* sp.), бели зелеви пеперуди (*Pieris* sp.), зелева нощенка (*Mamestra brassicae*), листоминиращи мухи (*Liriomyza* sp)									
4	Патладжан	П	Калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*), памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), нощенки (*Spodoptera* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-75 (трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма)	2	14	20 мл/дка	15-50 л/дка	4,8 г а.в./дка	3	
5	Ябълка	П	Пъстър миниращ молец (*Phyllonorycter blancardella*),ябълков молец (*Yponomeuta malinellus*), бяла американска пеперуда (*Hyphantria cunea),* листни бълхи (*Cacopsylla* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 52-59 (край на набъбването – повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) ВВСН 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване – размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)	2	14	20-60 мл /дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	

6	Круша, дюля, мушмула	П	Пъстър миниращ молец (*Phyllonorycter blancardella*), ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*),ябълков молец (*Yponomeuta malinellus*), бяла американска пеперуда (*Hyphantria cunea)*,листни бълхи (*Cacopsylla* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 52-59 (край на набъбването – повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) BBCH 71-74 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване – размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)	2	14	20-60 мл продукт/дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	
7	Праскова, кайсия, нектарина	П	Средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 53-59 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори – повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчици (бял бутон)) BBCH 71-73 (разрастване на яйчниа; окапване на завръзи след цъфтежа – вторично окапване на завръза)	2	14	20-60 мл /дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	40-120 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 60 мл/дка

8	Ягоди	П	Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), нощенки (*Spodoptera* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15 - 81 (пети лист развит – начало на узряване: повечето плодове са бели)	2	14	30 мл/дка	20-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	
9	Люцерна	П	Тютюнев трипс *(Thrips tabaci)*, грахова листозавивачка *(Cydia nigricana)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-72 (разлистени две листа – 20% от шушулките са достигнали крайната си дължина)	2	14	30 мл/дка	20-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	
10	Череши	П	Калифорнийска щитоносна въшка *(Quadraspidiotus perniciosus*), Черничева щитоносна въшка (*Pseudaulacaspis pentagona*), Средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*), Петнистокрила дрозофила (*Drosophila suzukii*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 01-81 (начало на събуждането (набъбване) на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища - начало на оцветяване)	1-2	14	25 мл/дка	50-150 л/дка	6 г а.в./дка	14	Да не се надвишава дозата от 25 мл/дка Не повече от две третирания за вегетационен сезон
			Листни въшки (*Myzus sp*.)		BBCH 15-39 (пет листа разтворени – леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина)	1-2	14	20-25 мл/дка	100 л/дка	4,8 – 6 г а.в./дка	14	

11	Черупкови овощни видове: бадеми, шамфъстък, леска, кестен	П	Листни въшки: прашеста прасковена листна въшка *(Hyalopterus amygdali) Brachycaudus amydalinus* *Eurytoma amygdali* Цикади: *Empoasca* sp. *Jacobiasca formosana*. *Jacobiasca lybica*, *Monosteira unicostate*, Лешников хоботник *Curculio nucum*, *Gonocerus acuteangulatus*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 51-79 (набъбване на цветните пъпки: пъпките са затворени-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)	2	14	40 мл/дка	50-100 л/дка	9,6 г а.в./дка	28	
12	Орех	П	Цикади: *Empoasca* sp. *Jacobiasca formosana*. *Jacobiasca lybica* *Gonocerus acuteangulatus*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 51-79 (набъбване на цветните пъпки: пъпките са затворени-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)	2	14	40 мл/дка	50-100 л/дка	9,6 г а.в./дка	28	

	Декоративни видове	П	Листни въшки (*Aphididae*), трипси *(Thripidae),* щитоносни въшки,пълзящи насекоми, видове от род *Lepidoptera,* листни цикади, акари, видове от род *Coleoptera,* белокрилки, мухи	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 24-69 (поява на четвърто странично разклонение – край на цъфтежа)	2	14	40 мл /дка	50-100 л/дка	9,6 г а.в./дка	-	40-80 мл продукт/100 л вода Да не се надвишава дозата от 40 мл/дка

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.