РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-2732/17.11.2023 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД – 4817/06.11.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10235/20.05.2022 г. от Байер България ЕООД и Писмо с вх. № 19861/12.10.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СИВАНТО ЕНЕРДЖИ**

Активни вещества: делтаметрин (deltamethrin) – 10 г/л

флупирадифурон (flupiradifurone) – 75 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Байер С.А.С./Bayer S.A.S., Франция

Производител на активното вещество делтаметрин: Байер АГ/Bayer AG, Германия

Производител на активното вещество флупирадифурон: Байер АГ/Bayer AG, Германия

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с комбинирано (системно и несистемно) действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л и 15 л бутилка/туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се използват дюзи намаляващи отвяването с 50, 75 или 90% при прилагането на продукта.
1.3 Да се носят работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици и предпазни очила/предпазна маска време на работа с продукта.
1.4 Да се носи работно облекло при повторно влизане в третираните площи.
1.5 Да не се прилага при изкуствено дренирани почви, с цел опазване на водните организми.
1.6 Да се осигурят нетретирана буферна зона и дюзи намаляващи разпръскването до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при следните култури:

- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 75% или 10 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 90% при пролетна пшеница, ечемик и ръж;
- Да се осигури нетретирана 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 75% при зимна пшеница, ечемик и ръж;
- Да се осигури нетретирана 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 90% при сладка царевица, сорго и просо в доза на употреба от 125 мл/дка;
- Да се осигури нетретирана 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 75% при сладка царевица, сорго и просо в доза на употреба от 75 мл/дка;
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 75% или 10 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 90% при сорго и просо в доза на употреба от 75 мл/дка;
- Да се осигури нетретирана 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 75% при картофи;
- Да се осигури нетретирана 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 75% при зимна рапица в доза на употреба от 75 мл/дка;
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 75% или 10 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 90% при пролетна рапица в доза на употреба от 75 мл/дка;
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 50% или 10 метра растителнозащитна

ивица и дюзи намаляващи разпръскването с 90% при зимна и пролетна рапица в доза на употреба от 50 мл/дка.

- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 75% при лозя.

1.7 Да се осигури нетретирана буферна зона 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 90% до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране при лозя.

1.8 Да се осигури нетретирана буферна зона 10 метра и дюзи намаляващи разпръскването с 75% или 5 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 90% до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.9 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флупирадифурон съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 09.12.2026 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СИВАНТО ЕНЕРДЖИ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **СИВАНТО ЕНЕРДЖИ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-2732/17.11.2023 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **СИВАНТО ЕНЕРДЖИ**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активните вещества: *делтаметрин – 10 г/л; **флупирадифурон – 75 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Мили-литра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Пшеница (зимна и пролетна)	П	*Rhopalosiphum padi* Овесена листна въшка (*Macrosiphum avenae*) Пиявици (*Lema* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 69-83 (край на цъфтежа – ранна восъчна зрялост)	2	14	50 мл / дка	20-60 л/дка	0,5* + 3,75** г а.в./дка	30	

			Житни дървеници (*Eurygaster* sp.)					75 мл / дка		0,75 * + 5,62** г а.в./дка		
2	Ечемик (зимен и пролетен)	П	Пиявици (*Lema* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 69-83 (край на цъфтежа – ранна восъчна зрялост)	2	14	50 мл / дка	20-60 л/дка	0,5* + 3,75** г а.в./дка	30	
3	Ръж (зимна и пролетна)	П	Овесена листна въшка (*Macrosiphum avenae*) Пиявици (*Lema* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 69-83 (край на цъфтежа – ранна восъчна зрялост)	2	14	50 мл / дка	20-60 л/дка	0,5* + 3,75** г а.в./дка	30	
			Житни дъвеници (*Eurygaster* sp.)					75 мл / дка		0,75 * + 5,62** г а.в./дка		
4	Маслодайна рапица	П	Рапичен стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus napi*) Зелев стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus quadridens*) Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*) Зелева листна въшка	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 69-79 (край на цъфтежа – почти всички шушулки са отворени)	2	14	75 мл/ дка	20-60 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка	45	

			(*Brevicoryne brassicae*)									
			Шушулков хоботник (*Ceutorhynchus assimilis*) Зелево комарче по шушулките (*Dasineura brassicae*)			2	14	50 мл / дка	20-60 л/дка	0,5* + 3,75** г а.в./дка		
7	Лозя (десертни и винени сортове)	П	Цикади (*Scaphoideus littoralis*) Зелени цикади (*Empoasca flavescens*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 69-81 (край на цъфтежа – начало на узряване)	2	14	40 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	0,4* + 3** г а.в./дка	14	
8	Картофи (и за преработка)	П	Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*), Картофен молец (*Phthorimaea operculella*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 31-49 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират – кожицата се е оформила напълно (кожицата в най-горния край на клубена не се отстранява с палец, 95% от клубените са в тази фаза))	1	-	75 мл/ дка	20-60 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка	14	Да не се третира през периода на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-2732/17.11.2023 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **СИВАНТО ЕНЕРДЖИ**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активните вещества: *делтаметрин – 10 г/л; **флупирадифурон – 75 г/л

	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Милилитра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Сладка царевица	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis*) Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 70-75 (край на цъфтежа – зърната от средната част на кочана са жълтеникаво-бели, съдържат около 40% сухо млекоподобно вещество)	1	-	125 мл/дка	40-80 л/дка	1,25* + 9,38 г а.в./дка	7	

			Rhopalosiphum padi Овесена листна въшка (*Macrosiphum avenae*), Западен царевичен коренов червей (*Diabrotica virgifera virgifera)*		ВВСН 51-58 (наличие на метлица на върха на стъблото – край на изметляването, 10 дни преди цъфтежа) или ВВСН 71-75 (начало на зреене на зърното: съдържанието на сухо вещество е около 16% - зърната от средната част на кочана са жълтеникаво-бели, съдържат около 40% сухо млекоподобно вещество)			75 мл/ дка	40-80 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка		
			Цикади (*Zyginidia* sp.)		ВВСН 14 -58 (разтваряне на четвърти лист – край на изметляването, 10 дни преди началото на цъфтеж) или ВВСН 71-75 (начало на зреене на зърното: съдържанието на сухо вещество е около 16% - зърната от средната част на			75 мл/ дка	20-80 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка		

					кочана са жълтеникаво-бели, съдържат около 40% сухо млекоподобно вещество)							
2	Просо	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis*) Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 51-75 (начало на изкласяване – средата на млечна зрялост)	1	-	125 мл/дка	40-80 л/дка	1,25* + 9,38 г а.в./дка	-	Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж
			Rhopalosiphum padi Овесена листна въшка (*Macrosiphum avenae*)		ВВСН 51-75 (начало на изкласяване – средата на млечна зрялост)			75 мл/ дка	40-80 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка		
			Цикади (*Zyginidia* sp.)		ВВСН 14-75 (развитие на листата – средата на млечна зрялост)			75 мл/ дка	40-80 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка		
3	Сорго	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis*) Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 51-75 (начало на изкласяване – средата на млечна зрялост)	1	-	125 мл/дка	40-80 л/дка	1,25* + 9,38 г а.в./дка	-	Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж
			Rhopalosiphum padi Овесена листна въшка		ВВСН 51-75 (начало на изкласяване – средата на			75 мл/ дка	40-80 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка		

			(*Macrosiphum avenae*)		млечна зрялост)							
			Цикади (*Zyginidia* sp.)		BBCH 14-75 (развитие на листата – средата на млечна зрялост)			75 мл/ дка	40-80 л/дка	0,75 * + 5,62** г а.в./дка		
4	Вид синап/сарепска горчица (пролетна)	П	Рапичен стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus napi*) Зелев стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus quadridens*) Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*) Зелева листна въшка (*Brevicoryne brassicae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 30-79 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия – почти всички шушулки са ооформени)	2	14	75 мл / дка	20-60 л/дка	0,75 + 5,62 г а.в./дка	45	Да не се третира по време на период на цъфтеж и периода преди цъфтеж
			Шушулков хоботник (*Ceutorhynchus assimilis*) Зелево комарче по шушулките (*Dasineura brassicae*)					50 мл / дка	20-60 л/дка	0,5 + 3,75 г а.в./дка		
5	Вид синап/сарепска горчица (зимна)	П	Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*) Зелева листна въшка (*Brevicoryne brassicae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 30-79 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия – почти всички шушулки са ооформени)	2	14	75 мл / дка	20-60 л/дка	0,75 + 5,62 г а.в./дка	45	Да не се третира по време на период на цъфтеж и периода преди цъфтеж
			Шушулков хоботник (*Ceutorhynchus assimilis*)					50 мл / дка	20-60 л/дка	0,75 + 5,62 г а.в./дка		

			Зелево комарче по шушулките (*Dasineura brassicae*)									

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

Recoverable Signature

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Кожна сенсибилизация, категория 1 Сериозно увреждане на очите, категория 1 Остра инхалационна токсичност, категория 4 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H317 H318 H332 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасно	H302 H317 H318 H332 H410	EUH 401	SP1 SPe2 SPe3 SPe8