РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-124

София, 19.01.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД – 4757/13.12.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 19572/16.12.2019 г. на фирма АСЦЕНЗА АГРО С.А./ASCENZA AGRO S.A., Португалия, с упълномощен представител „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД, Писмо с Вх. № 7591/12.05.2020 г. и Писмо с Вх. № 21789/18.11.2022 г. от „ХИМКОНСУЛТ“ ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МЕЛВАР**

Активно вещество: протиоконазол (prothioconazole) – 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: АСЦЕНЗА АГРО С.А./ASCENZA AGRO S.A., Португалия

Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на АСЦЕНЗА АГРО С.А./ Португалия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

1 л бутилка, 5 л, 10 л и 20 л туба от COEX (HDPE/EVOH)*
Означение: *коекструтидаран полиетилен с висока плътност/етилен/винил алкохол

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се носят лични предпазни средства – подходящо работно облекло по време на смесване/зареждане на продукта плюс защитни ръкавици по време на работа с продукта.
1.3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица за зимни зърнено-житни култури и нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица за пролетни зърнено-житни култури, до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 2 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 31.07.2024 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **МЕЛВАР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **МЕЛВАР** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на

разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-124/19.01.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **МЕЛВАР**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: протиоконазол – 250 г/л

	Култура и/или описание	П/ О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карант-инен срок (дни)	Забе-лежки
№	(a)	(b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер-вал между прилож. дни (мин)	Мили-литра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка Мин/ макс	(l)	(m)
1.	Пшеница (зимна и пролетна; мека и твърда)	П	Фузариози (*Fusarium* sp.) листни петна (септориоза) (*Septoria* sp.) ръжди (*Puccinia* sp.)	Механизи-рана наземна техника	BBCH 26-69 (6 братя - край на цъфтежа)	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
2.	Ечемик (пролетен и зимен)	П	Фузариоза (*Fusarium* sp.), мрежести петна (*Pyrenophora teres)* листен пригор (*Rhynchosporium secalis)*, ръжди (*Puccinia* sp.),	Механизи-рана наземна техника	BBCH 26-69 (6 братя - край на цъфтежа)	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
3.	Овес	П	Фузариози (*Fusarium* sp.), ръжди (*Puccinia* sp.),	Механизи-рана наземна техника	BBCH 26-69 (6 братя - край на цъфтежа)	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	

4.	Ръж		Фузариози (*Fusarium* sp.), листен пригор (*Rhynchosporium secalis)*, ръжди *(Puccinia* sp.)	Механизирана наземна техника	BBCH 26-69 (6 братя - край на цъфтежа)	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
5.	Тритикале		Фузариози (*Fusarium* sp.), листни петна (септориоза) *(Septoria* sp.)	Механизирана наземна техника	BBCH 26-69 (6 братя - край на цъфтежа)	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
6.	Маслодайна рапица	П	Склеротиниоза (бяло гниене) (*Sclerotinia sclerotiorum)*, чернилка *(Alternaria brassicae)*	Механизирана наземна техника	BBCH 20-80 (няма странични разклонения - започване на узряване: зелени семена, чувство за празни шушулки)	2	14-21	70 мл/дка	20-40 л/дка	17,5 г а.в./дка	56	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-124/19.01.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **МЕЛВАР**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: протиоконазол – 250 г/л

	Култура и/или описание	П/ О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка Мин/ макс	(l)	(m)
1.	Ечемик (пролетен и зимен)	П	Рамулариоза *(Ramularia collo-cygni)* Паразитно полягане *(Oculimacula yallundae)*	Механизирана наземна техника	BBCH 26-69	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
2.	Овес	П	Брашнеста мана (*Blumeria graminis)* Паразитно полягане *(Oculimacula yallundae)*	Механизирана наземна техника	BBCH 26-69	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
3.	Тритикале		Брашнеста мана *(Blumeria graminis)*	Механизирана наземна техника	BBCH 26-69	2	14	80 мл/дка	15-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	

4.	Маслодайна рапица	П	Цилндриоспориоза (*Pyrenopeziza brassicae)* Брашнеста мана *(Erysiphe cruciferarum)*	Механизи-рана наземна техника	ВВСН 20-80	2	14-21	70 мл/дка	20-40 л/дка	17,5 г а.в./дка	56	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение 2 на настоящата заповед.

2. Всяка липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-124/19.01.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH401	SP фрази: SP1 SPe3