РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2158

София, 30.09.2022 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД – 3081/01.09.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления вх. № 1930/27.01.2021 г., 9577/12.05.2022 и 13913/18.06.2021 г. на фирма БАСФ СЕ/BASF SE, Федерална република Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД и Писмо с Вх. № 16018/23.08.2022 г. от БАСФ ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДАКСЪР**

Активни вещества:
мефентрифлуконазол (mefentrifluconazole) – 100 г/л
крезоксим-метил (kresoxim-methyl) – 150 г/л;

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Агро Б.В./BASF Agro B.V., Швейцария

Производител на активното вещество:
мефентрифлуконазол: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 на РЕГЛАМЕНТ 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ, Германия

крезоксим-метил: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 на РЕГЛАМЕНТ 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от HDPE и f-HDPE
5 л, 10 л, 20 л и 50 л контейнер от HDPE и f -HDPE
1 л еко-бутилка от HDPE и f-HDPE
5 л, 10 л и 15 л еко-контейнер от HDPE и f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се използват лични предпазни средства – подходящо работно облекло (покриващо ръцете, тялото и краката) и защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.3 Да се носи подходящо работно облекло (покриващо ръцете, тялото и краката) при повторно влизане в третираните площи.
1.4 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растително защитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество крезоксим-метил съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 31.12.2025 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ДАКСЪР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ДАКСЪР** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2158/30.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **ДАКСЪР**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: мефентрифлуконазол – 100 г/л; крезоксим-метил – 150 г/л

	Култура и/или описание	П/ О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт / дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка Мин/макс	(l)	(m)
1	Пшеница (зимна и пролетна, твърда) Спелта	П	Брашнеста мана *(Erysiphe graminis)*, ран листен пригор (*Septoria/Zymoseptoria tritici*), кафява ръжда (*Puccinia triticina/Puccinia recondita*), жълта ръжда (*Puccinia striiformis)*, жълто-кафяви петна *(Pyrenophora tritici-repentis)*, базично гниене *(Oculimacula/ Pseudocercosporella* sp.)	Механизирана наземна техника	ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	2	14	60-100 мл/дк	10-30 л/дка	6* + 9** – 10* + 15** г а. в./дка	35	

2	Ечемик (зимен и пролетен)	П	Брашнеста мана *(Erysiphe graminis)*, мрежести петна (*Pyrenophora teres)*	Механизирана наземна техника	BBCH 30-49 (начало на удължаване на стъблото – видими първи осили (само при осилестите форми))	2	14	60-100 мл/дк	10-30 л/дка	6* + 9** – 10* + 15** г а. в./дка	35	
3	Тритикале	П	Листен пригор (*Septoria sp.*), кафява ръжда (*Puccinia triticina/Puccinia recondita*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	2	14	60-100 мл/дк	10-30 л/дка	6* + 9** – 10* + 15** г а. в./дка	35	
4	Ръж	П	Кафява ръжда *(Puccinia recondita*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)	2	14	60-100 мл/дк	10-30 л/дка	6* + 9** – 10* + 15** г а. в./дка	35	

Означения: мефентрифлуконазол*; крезоксим-метил**

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2158/30.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **ДАКСЪР**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: мефентрифлуконазол – 100 г/л; крезоксим-метил – 150 г/л

	Култура и/или описание	П/ О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка Мин/макс	(l)	(m)
1	Ечемик (зимен, пролетен)	П	Листен пригор *(Rhinchosporium secalis*) Рамулария (*Ramularia collo-cygni)*	Механизирана наземна техника	BBCH 30-49 (начало на удължаване на стъблото – видими първи осили (само при осилестите форми))	2	14	60-100 мл/дка	10-30 л/дка	6* + 9** – 10* + 15** г а. в./дка	35	

Означения: мефентрифлуконазол*; крезоксим-метил**

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ **ДАКСЪР** съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ **ДАКСЪР** съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2158/30.09.2022 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Кожна сенсебилизация, категория 1 Канцерогенност, категория 2 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 1	H315 H317 H351 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H315 H317 H351 H410	EUH401 EUH 208: Съдържа изотиазолинони (CIT, MIT и BIT). Може да причини алергична реакция.	SP фрази: SP1 SPe3