**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

**№ РД 11-115**

**София, 18.01.2022 г.**

На основание чл. 57 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), и Предложение с вх. № ВД – 4757/13.12.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 96959/06.12.2021 г. от Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия, с упълномощен представител АДАМА България ЕООД,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание 4/15.11.2021 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**, с притежател на разрешението Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия, както следва:

1.1. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с „**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**“ на настоящата заповед.

1.2. В частта „**Особени изисквания и/или ограничения**“ се добавя следния текст:

„Да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностни води с цел опазване на водните организми при следните култури:

- 5 метра при захарно цвекло (при употреба във фенофази BBCH 15-39);

- 5 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 30% при зърнени култури, маслодайна рапица, патладжан, краставици, корнишони и тиквички;

- 5 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50 % при бобови култури, моркови, червено цвекло, артишок, кардун, карфиол, главесто и брюкселско зеле, пъпеш, люцерна;

- 10 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% при марули и други подобни култури;

- 10 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 80% при лозя;

- 15 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 80% при цитрусови култури;

- 20 метра с включени дюзи намаляващи разпръскването с 80% при семкови и костилкови овощни култури и декоративни видове.

Да се осигури нетретирана буферна зона до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногит, при следните култури:

- 5 метра при лозя, патладжан, декоративни видове, бобови;

- 10 метра при цитрусови култури;

- 20 метра при семкови и костилкови овощни култури.

**Мотиви по т. 1.1 и 1.2:**

Със Заявление с Вх. № 26959/06.12.2021 г. от Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия се заявява промяна на **РАЗРЕШЕНИЕ № 0096 – ПРЗ Издание 4/15.11.2021 г.**, като бъдат разрешени допълнителни употреби в множество култури. Основание за заявлението е чл. 57 от ЗЗР.

Заявеното със Заявление с вх. № 26959/06.12.2021 г. изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, като доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 18765/07.10.2022 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде **РАЗРЕШЕНИЕ № № 0096 – ПРЗ Издание 4/15.11.2021 г.** за пускане на пазара и употреба на продукта **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф** на Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**, етикетирани съгласно **РАЗРЕШЕНИЕ № № 0096 – ПРЗ Издание 4/15.11.2021 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 67, ал. 3 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ИВАН ШИКОВ: /п/**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-115/18.01.2023 г.**

Търговско наименование на продукта: **МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф**

Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)

Концентрация на активно/и вещество/а: тау-флувалинат – 240 г/л

| | Култура и/или описание | П О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | (c) | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин /макс (k) | Интер-вал между прилож. дни (мин) | Мл продукт /дка Мин/макс | Вода л/дка Мин/ макс | Грама активно вещество/дка | (l) | (m) |
| | Пшеница | П | Вредна житна дървеница (*Eurogaster integriceps*) Обикновена житна пиявица (*Oulema melanopa*) Овесена листна въшка (*Sitobion avenae*), брястова листна въшка (*Rhopalosiphum padi*), пшеничена галица (*Contarinia tritici*), галица (*Sitodiplosis mosellana)*, житна цикада (*Psammotettix alienus*), остроглава житна дървеница | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 21-75 (начало на братене – средата на млечна зрелост) | 2 | 10-14 | 20 мл/дка | 20-40 л/дка | 4,8 г а.в./дка | 30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (*Aelia rostrata*), мавърска житна дървеница (*Eurygaster maura*) | | | | | | | | | |
| | Ечемик, овес, ръж, тритикале | П | Овесена листна въшка *(Sitobion avenae),* брястова листна въшка *(Rhopalosiphum padi),* пшеничена галица *(Contarinia tritici),* галица *(Sitodiplosis mosellana),* житна цикада *(Psammotettix alienus),* остроглава житна дървеница *(Aelia rostrata),* мавърска житна дървеница *(Eurygaster maura)* | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 10-75 (първи лист от колеоптила - средата на млечна зрялост) | 2 | 14 | 20 мл/дка | 10-40 л/дка | 4,8 г а.в./дка | 30 | |
| | Маслодайна рапица (зимна и пролетна) | П | Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*) Рапичен стъблен скритохоботник (*Ceutorhynchus napi*) Рапична стъблена бълха (*Psylliodes chrysocephala*) | Конвен-ционална наземна техника Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 13-54 (разтворен трети лист – видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (основно цветообразуване)) | 2 | 14 | 20 мл/дка | 10-40 л/дка | 4,8 г а.в./дка | 30 | |
| | | | Зелева листна въшка (*Brevicoryne brassicae*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*) | | Зимна маслодайна рапица: ВВСН 10-57 (напълно оформени котиледони-видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени | | | | 20-40 л/дка | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (вторично цветообразуване))<br><br>Пролетна маслодайна рапица: ВВСН 31-57 (видимо нарастване на първо междувъзлие-видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване)) | | | | | | | |
| | Захарно цвекло | П | Листни въшки (*Aphis fabae*) | Конвенционална наземна техника | ВВСН 15-39<br><br>(разлистени 5 листа – листата покриват 90% от повърхността) | 2 | 14 | 20 мл/дка | 20-40 л/дка | 4,8 г а.в./дка | 14 | |
| | Фасул, бакла и грах (зелени без шушулки) | П | Зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum*), черна бобова листна въшка (*Aphis fabae*), трипс (*Thrips angusticeps*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*), грахова листозавивачка (*Cydia nigricana*), грахова галица (*Contarinia pisi*) | Конвенционална наземна техника | ВВСН 09-85<br><br>за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване -50% от чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период))<br><br>за бакла | 2 | 14 | 30 мл/дка | 50-100 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 7 | .<br>. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди)<br>за грах<br>(поникване: кълнът пробива повърхността на почвата („разпукване“) – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди) | | | | | | | |
| | Зрял фасул, леща, нахут, посевно секирче (*Lathyrus sativus*) и грах (варива) | П | Зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum*), черна бобова листна въшка (*Aphis fabae*), трипс (*Thrips angusticeps*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*), грахова листозавивачка (*Cydia nigricana*), грахова галица (*Contarinia pisi*) | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 09-85<br>(поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди) | 2 | 14 | 30 мл/дка | 50-100 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 14 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Моркови, червено цвекло | П | *Cavariella aegopodii*, зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), *Semiaphis dauci* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени; точката на нарастване или първи несъщински лист видими - край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер) | 2 | 14 | 30 мл/дка | 15-40 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 14 | |
| | Артишок, кардун | П | Листни въшки (*Aphis fabae, Aphis solanella, Capitophorus horni, Brachycaudus cardui*), трипси *(Thrips sp.),* нощенки (*Spodoptera* sp.) | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-49 | 2 | 14 | 30 мл/дка | 10-40 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 7 | |
| | Карфиол, главесто зеле и брюкселско зеле | П | Зелева листна въшка (*Brevicoryne brassicae*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), трипси *(Thrips sp.),* бели зелеви пеперуди (*Pieris* sp.), зелева нощенка (*Mamestra brassicae*) | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени-типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) | 1 | - | 30 мл/дка | 10-50 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Маруля и други подобни (маруля, бейби маруля, ендивия, | П | Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Nasonovia ribisnigri*, *Uroleucon cichorii*), | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 12-49<br>(разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса) | 2 | 14 | 40 мл/дка | 30-50 л/дка | 9,6 г а.в./дка | 14 | |
| | Патладжан | П | Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Macrosiphum* sp.), | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 13-75<br>(трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма) | 2 | 14 | 20 мл/дка | 15-50 л/дка | 4,8 г а.в./дка | 3 | |
| | Краставици, корнишони, тиквички | П | Памукова листна въшка (Aphis gossypii) Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Macrosiphum* sp.), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*) | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 15-84<br>(пети лист разтворен – 40% от плоодовете са с типичен цвят на зреене ) | 2 | 14 | 20 мл/дка | 20-100 л/дка | 4,8 г а.в./дка | 7 | |
| | Пъпеш | П | Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), листни въшки (*Macrosiphum* sp.), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis*), тютюнев трипс (*Thrips tabaci*) | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 15-89<br>(пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен- пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) | 2 | 14 | 30 мл/дка | 50-100 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ябълка, круша, дюля, мушмула | П | Плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), кафява мраморна дървеница (*Halyomorpha halys*), | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 52-59<br>BBCH 71-81 | 2 | 14 | 20-60 мл/дка | 50-150 л/дка | 4,8-14,4 г а.в./дка | 30 | |
| | | | ябълково-живовлекова листна въшка *(Dysaphis plantaginea)*, зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi), Contarinia pyrivora, Dasineura pyri* | | BBCH 00/01-59<br>BBCH 71-81 | | | | | | | |
| | Праскова, кайсия, нектарина | П | Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*), източен плодов червей (*Cydia molesta*), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis)*, трипси (*Thrips* sp.) | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 53-59<br>BBCH 71-81 | 2 | 14 | 20-60 мл/дка | 50-150 л/дка | 4,8-14,4 г а.в./дка | 30 | 40-120 мл продукт /100 л вода |
| | | | Листни въшки *(Hyalopterus amygdali, Myzus persicae, Brachycaudus persicae)* | | BBCH 01-59<br>BBCH 71-81 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Лозя<br>(трапезни и винени сортове) | П | Лозова цикада (*Empoasca vitis)*, американска лозова цикада (*Scaphoideus titanus*), калифорнийски трипс (*Frankliniella occidentalis)*, лозов трипс (*Drepanothrips reuteri*) | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 53-85<br>(съцветията се виждат изцяло-омекване на зърната) | 2 | 14 | 30 мл/дка | 10-100 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 21 | 30-300 мл продукт /100 л вода |
| | Люцерна | П | Грахова листна въшка *(Acyrthosiphon pisum)*, черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)*, малък люцернов листен хоботник *(Hypera postica)*, ивичест грудков хоботник *(Sitona lineatus)*, детелинов хоботник *(Apion pisi)*, люцернов листояд *(Phytodecta fornicata)*, жълт люцернов тихиус *(Tychius flavus)*, | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 12-72 | 2 | 14 | 30 мл/дка | 20-100 л/дка | 7,2 г а.в./дка | 7 | Да не се прилага по време на цъфтеж |
| | Цитрусови култури | П | Листни въшки (*Aphis sp., Toxoptera aurantii)* цитрусов молец *(Prays citri*) | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 01-59<br>(начало на набъбване на пъпките – повечето цветове формират куха топка) | 2 | 14 | 40 мл/дка | 100-200 л/дка | 9,6 г а.в./дка | 30 | 20-40 мл продукт /100 л вода |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции