РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2163

София, 20.09.2023 г.

На основание чл. 67, ал. 1, чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 60, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3988/14.09.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 841/12.01.2023 г. от Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия, с упълномощен представител АДАМА България ЕООД и Писмо с вх. № 12310/27.06.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Разрешение № 01848–ПРЗ Издание: 1/15.06.2020 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита (ПРЗ) **МЕРПАН 80 ВГ**, съдържащ активното вещество каптан – 800 г/кг, с притежател на разрешението Адама Агрикалчър БВ, Холандия, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта **„Активно/и вещество/а:“** думата **„каптан”** да се замени с **„каптан/captan“.**

1.2. На стр. 1 в частта **„Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба:“** думите **„Адама Агрикалчър БВ, Холандия“** да се заменят с **„Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия“.**

1.3. На стр. 1 в частта **„Срок на валидност:”** датата „**31.07.2021 г**.” да се замени с „**15.11.2025 г**.”.

Мотиви по т. 1.3.: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество каптан до 15.11.2024 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/918 на Комисията от 4 май 2023 година.

1.4. Да се добави част „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.4: Със Заявление с вх. № 841/12.01.2023 г. на БАБХ от Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия се заявява изменение на **Разрешение № 01848–ПРЗ Издание: 1/15.06.2020 г.** на изпълнителния директор на БАБХ чрез разширяване на обхвата на разрешението за минимални употреби.

Заявеното изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 12310/27.06.2023 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **МЕРПАН 80 ВГ**, етикетирани в съответствие с **Разрешение № 01848–ПРЗ Издание: 1/15.06.2020 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

4. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който ПРЗ **МЕРПАН 80 ВГ** ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал . 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2163/20.09.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **МЕРПАН 80 ВГ**
Формулация: водоразтворими гранули (ВГ)
Концентрация на активно/и вещество/а: каптан – 800 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (мин)	Грама продукт/дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1	Ягоди	О	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)*	Механизирана наземна техника Насочено надолу пръскане	BBCH 60-81 (първи отворени цветове - начало на узряване) Септември - Април	2	10	90-180 г/дка	60-120 л/дка	72-144 г а.в./дка	14	
2	Касис, Боровинка и Цариградско грозде	О	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)*	Механизирана наземна техника Насочено надолу пръскане	BBCH 60-87 (първи отворени цветове - беритбена зрялост) Март - Септември	2-6	7	150-180 г/дка	100-120 л/дка	120-144 г а.в./дка	7	Максимум 1.62 кг продукт /дка (1.296 кг каптан/дка)

					ВВСН 93-97 (започва листопада - всички листа са окапали) и ВВСН 00 (Покой. Листните пъпки и дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи) Октомври - Март	3					-	
3	Къпина, Малина	О	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)*	Механизирана наземна техника Насочено надолу пръскане	ВВСН 60-87 (първи отворени цветове - беритбена зрялост) Март - Септември	6	7	150-180 г/дка	100-120 л/дка	120-144 г а.в./дка	7	Максимум 1.62 кг продукт /дка (1.296 кг каптан/дка)
			Сиво гниене *(Botrytis cinerea)*, Дидимела (петносване на пъпките) *(Didymella applanate)*		ВВСН 87-93 (беритбена зрялост - започва листопада) Юни- Октомври	2-3	7				-	

4	Лалета (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,33 % (330 г продукт / 100 л вода)	65 л/дка	270 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 3 минути

5	Гладиоли (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	36 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 3 минути

6	Гладиоли *Gladiolus* sp. с изключение на *Gladiolus nanus* и *Gladiolus colvilii*	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	1,3 % (1,3 кг продукт / 100 л вода)	36 л/дка	1040 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 15 минути

7	Лилии форсиране (само за луковици, които не се свързват с почва)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	70 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Само защитена култура, която не е свързана с почвата. Третиране чрез потапяне до 3 минути

8	Нарцис нормален (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.*),* кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.*)* и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	187,5 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Само защитена култура, която не е свързана с почвата. Третиране чрез потапяне до 3 минути

9	Нарцис миниатюрен (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	65 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 3 минути

10	Зюмбюл (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.*),* кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.*)* и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	71,5 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 3 минути

11	Ирис (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	49 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 3 минути

12	Минзухар (форсиране в саксии)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	0,66 % (660 г продукт / 100 л вода)	48,8 л/дка	530 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 3 минути

13	Анемоне (форсиране)	О	Синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* Видове антракноза *(Colletotrichum* spp.), кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.) и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката	Потапяне	Преди засаждане BBCH 00 Януари- Декември	1	-	1 % (1 кг продукт / 100 л вода)	56 л/дка	800 г а.в. / 100 л вода	-	Третиране чрез потапяне до 2 часа

14	Разсадници за дървета	О	Видове струпясване *(Venturia macularis, Venturia Spp), Dematiaceae, Exobasidium vaccinii, E. rhododendri, E. vaccinii var. Japonicum*	Механизирана наземна техника Насочено надолу пръскане	ВВСН 31-89 Януари- Декември	5	10	75-200 г/дка	50-100 л/дка	60 -160 г а.в./дка	-	
15	Многогодишни декоративни растения	О	*Ramularia agrestis, Mycocentrospora acerina*	Механизирана наземна техника Насочено надолу пръскане	ВВСН 31-89 Януари- Декември	5	10	75-200 г/дка	50-100 л/дка	60 -160 г а.в./дка	-	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **МЕРПАН 80 ВГ,** съгласно Приложение № 1 от настоящата заповед за контрол на сиво гниене *(Botrytis cinerea)* при ягоди, касис, боровинка и цариградско грозде; на сиво гниене *(Botrytis cinerea),* дидимела (петносване на пъпките) *(Didymella applanate)* при къпина и малина; контрол на синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* видове антракноза *(Colletotrichum* spp.*),* кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.*)* и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката при лалета (форсиране), гладиоли (форсиране), гладиоли *Gladiolus sp.* с изключение на *Gladiolus nanus* и *Gladiolus colvilii,* лилии форсиране (само за луковици, което не се свързват с почва), нарцис нормален (форсиране), нарцис миниатюрен (форсиране), зюмбюл (форсиране), ирис (форсиране), минзухар (форсиране в саксии) и анемоне (форсиране); контрол на видове струпясване *(Venturia macularis, Venturia* Spp*), Dematiaceae, Exobasidium vaccinii, E. rhododendri, E. vaccinii var. Japonicum* в разсадници за дървета; контрол на *Ramularia agrestis, Mycocentrospora acerina* при многогодишни декоративни растения.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **МЕРПАН 80 ВГ,** съгласно Приложение № 1 от настоящата заповед, за контрол на сиво гниене *(Botrytis cinerea)* при ягоди, касис, боровинка и цариградско грозде; на сиво гниене *(Botrytis cinerea),* дидимела (петносване на пъпките) *(Didymella applanate)* при къпина и малина; контрол на синьозелено плесеново гниене *(Penicillium* spp.*),* видове антракноза *(Colletotrichum* spp.*),* кафяво (питийно) гниене по корените *(Pythium* spp.*)* и подобряване на качеството на кожата луковицата/грудката при лалета (форсиране), гладиоли (форсиране), гладиоли *Gladiolus sp.* с изключение на *Gladiolus nanus* и *Gladiolus colvilii,* лилии форсиране (само за луковици, което не се свързват с почва), нарцис нормален (форсиране), нарцис миниатюрен (форсиране), зюмбюл (форсиране), ирис (форсиране), минзухар (форсиране в саксии) и анемоне (форсиране); контрол на видове струпясване *(Venturia macularis, Venturia* Spp*), Dematiaceae, Exobasidium vaccinii, E. rhododendri, E. vaccinii var. Japonicum* в разсадници за дървета; контрол на *Ramularia agrestis, Mycocentrospora acerina* при многогодишни декоративни растения, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения