РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1409

София, 09.06.2023 г.

На основание чл. 68, във връзка с ал. 2, чл. 55 ал. 1 и ал. 2, ч;. 60, ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) във връзка с чл. 33-39, чл. 46 чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2389/30.05.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 3989/22.02.2021 г. от „Лаинко С.А.”, Испания, с упълномощен представител „Химконсулт” ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01604-ПРЗ-Издание: 1/25.07.2018 г., изменено със Заповед № РД 11-2619/24.11.2020 г., на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СИВАР**, съдържащ активното вещество азоксистробин – 250 г/л, с притежател на разрешението „Лаинко С.А.”, Испания, както следва:

   1.1. На стр. 1 в частта „Активно/и вещество/а:“ „азоксистробин“ да се замени с думите: „азоксистробин (azoxystrobin)“.

   1.2. На стр. 1 в частта „Производител/и:“ се добавя текста „информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на „Лаинко С.А.”, Испания.

   1.3. На стр. 1 в частта „Функция на продукта:‘‘ думата „фунгицид‘‘ се заменя с „фунгицид със системно действие‘‘.

   1.4. На първа страница в частта „Категория на употреба:” думата „непрофесионална‘‘ се заменя с „втора професионална‘‘.

Мотиви по т. 1.4.:

Съгласно Доклад за оценка в област на оценка „Токсикология на бозайниците‘‘, от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предоставени в БАБХ с Писмо с вх. № 6922/04.04.2023 г., категорията на употреба се променя от непрофесионална на втора професионална.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

1.5. На стр. 1 в частта „Срок на валидност” датата „**31.12.2022 г.”** се заменя с „**31.12.2025 г**.”

Мотиви по т. 1.5.:

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/291 на Комисията от 19 февруари 2019 година, датата на изтичането на срока на одобрението на активното вещество **азоксистробин** се заменя с 31 декември 2024 г.

1.6. В частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** да се добави Приложение № 1 за разрешените употреби и Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към настоящата заповед.

1.7. На стр. 5 в частта **„Особени изисквания/и/или ограничения“** да се добави текстът:

- Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици и работно облекло, покриващо цялото тяло, по време на работа с продукта в оранжерии.
- Да се използва работно облекло, покриващо цялото тяло, и предпазни ръкавици при повторно влизане в третираните площи.
- Да не се прилага при дренирани почви, с цел опазване на водните организми при картофи и бобови култури (късно приложение).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, включваща 10 метра растително защитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при листни зеленчуци, грах, бобови култури (ранно приложение) и маслодайна рапица.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, включваща 20 метра растително защитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при бобови култури (късно проложение), тиквови с неядлива кора, пипер (оранжерии) и патладжан (оранжерии).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, или 10 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 75%, или дюзи намаляващи разпръскването с 90%, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при райска ябълка.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до овощните градини с райска ябълка с цел опазване на нецелевите организми, които не са обект на третиране.”

Мотиви по т. 1.7: Съгласно Доклади за оценка в област на оценка от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предоставени в БАБХ с Писмо с вх. № 6922/04.04.2023 г. се добавят горепосочените особени изисквания и/или ограничения.

2. На основание чл. 55, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде Разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на „Лаинко С.А.”, Испания.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **СИВАР**, етикетирани съгласно Разрешение № 01604-ПРЗ-Издание: 1/25.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1., т.1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1409/09.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **СИВАР**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно вещество: азоксистробин – 250 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	грама а. в./дка	(l)	(m)
1	Картофи	П	Алтернария (*Alternaria solani*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 mm) от първото съцветие (главно стъбло) - плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)	1-2	14	50 мл продукт /дка	20-100 л/дка	12,5 г а. в./дка	7 дни	

2	Зрял грах, зелен грах (зърна), зелен грах (шушулки)	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi*), ръжда (*Uromyces pisi)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 17-72 (7 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 7 мустачета - 20 % от шушулките са достигнали типична дължина)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	15-80 л/дка	20-25 г а. в./дка	35 дни	
3	Бакла	П	Аскохитоза (*Ascochyta fabae*), Ръжда (*Uromyces* sp.*)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-79 (няма странични разклонения - почти всички бобове са достигнали крайна дължина)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	15-80 л/дка	20-25 г а. в./дка	35 дни	
4	Зелен фасул	П	Аскохитоза (*Ascochyta fabae*), Ръжда (*Uromyces* sp.*)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-79 (начало на формиране на странични разклонения - чушки: отделни фасулиеви зърна се виждат лесно)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	15-80 л/дка	20-25 г а. в./дка	14 дни	
5	Маслодайна рапица	П	Алтернария (*Alternaria* sp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 60-67 (10 % от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос - прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали)	1-2	10	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	25 г а. в./дка	21 дни	
6	Пипер	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (първо съцветие, изправена пъпка - пълна зрялост)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	3 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1409/09.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **СИВАР**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин – 250 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	грама а. в./дка	(l)	(m)
1	Райска ябълка	П	*Mycosphaerella nawae*	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-69	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	50-100 л/дка	20-25 г а. в./дка	-	

2	Артишок	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-55	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	7 дни	
3	Броколи	П	Мана (*Peronospora parasitica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	14 дни	
4	Карфиол	П	Мана (*Peronospora parasitica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	14 дни	
5	Патладжан	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	50-100 л/дка	20-25 г а. в./дка	3 дни	

6	Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	3 дни	
7	Маруля, полска салата, ескариол (широколистна ендевия), кресон, земен кресон, аругула (рукола), червен синап, листа и стъбла от род Brassica, включително от ряпа	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-48	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	7 дни	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **СИВАР** за вредител или група вредители, с които се води борба от **Приложение № 2**.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **СИВАР** за контрол на за вредител или група вредители, с които се води борба от **Приложение № 2** е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения