РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1366

София, 07.06.2023 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 2389/30.05.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 28331/21.10.2021 г. от Мицуи АгриСайънс Интернешънъл С.А./Н.В/Mitsui AgriScience International S.A./N.V.Белгия, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: АГРИ®50 ВГ

Активно вещество: Bacillus thuringiensis ssp. aizawai щам GC-91 (Bta GC-91) - 3.10^{13} КОЕ/кг или 500 г Bta GC-91/к

Производител на продукта за растителна защита: Сертис ЮЕсЕй ЛЛС/Certis USA LLC, САЩ

Производители на активното вещество Bacillus thuringiensis ssp. aizawai щам GC-91 (Bta GC-91): Сертис ЮЕсЕй ЛЛС/Certis USA LLC, САЩ

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 200 г, 500 г, 1кг, 5 кг, 10 кг и 30 кг полиетиленови пликове в картонени кутии

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се носят ръкавици и респираторна маска при работа с продукта.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество Bacillus thuringiensis ssp. aizawai щам GC-91 (Bta GC-91), съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.08.2025 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АГРИ®50 ВГ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита АГРИ®50 ВГ съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Мицуи АгриСайънс Интернешънъл С.А./Н.В/Mitsui AgriScience International S.A./N.V.Белгия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1366/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: АГРИ 50 ВГ
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: Bacillus thuringiensis ssp. aizawai щам GC-91 (Bta GC-91) 500 г/кг; биопотенциал: 25 000 IU/mg продукт; спори: 3 x 1013 CFU/кг

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер- вал между прилож. дни (мин-макс)	Грама продукт /дка (грама МРСР** hL) Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка (грама МРСА* hl) Мин/макс	(l)	Kg*МРСА/ha Kg**МРСР/ha
1	Лозя	П	Сем. *Tortricidae* – листозавивачки (шарен гроздов молец *Lobesia botrana*, еднопоясен гроздов молец *Eupoecilia ambiguella*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 53-99 (съцветията се виждат изцяло – реколтиран продукт)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмичен период без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)

2	Ябълки Круши	П	Сем. *Tortricidae* – листозавивачки (*Archips spp,. Pandemis spp.*, плодова корогризачка *Adoxophyes reticulana*, малка лозова листозавивачка *Argyrotaenia pulchellana*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 53-99 (Разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете – Продукцията е прибрана)	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	-	0,5-1,0 (1-2)
3	Зелеви култури Цветно зеле: карфиол, броколи и др., зелеви култури, формиращи глави: брюкселско зеле, главесто зеле; Листни зелеви култури: китайско зеле, кейл	П О	сем. Noctuidae - нощенки (зелева нощенка Mamestra brassicae, Spodoptera spp., и др.), сем.Pieridae – бели пеперуди (Pieris spp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200) 50-100 (100)	50-100	50-100 (100) 25-50 (50)	-	0,5-1,0 (1-2)

4	Ряпа Репички	П О	сем.Pieridae – бели пеперуди (*Pieris spp.)*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
5	Домати Пипер Патладжан	П О	Сем. *Noctuidae* – нощенки (памукова нощенка *Heliothis armigera, Spodoptera spp., Plusia spp*. и др.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (Втори същински лист – Пълна зрялост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
6	Домати Патладжан	П О	сем. *Gelechiidae* (доматен миниращ молец *Tuta absoluta*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (Втори същински лист – Пълна зрялост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	
7	Пипер Патладжан	П О	Сем. Noctuidae – нощенки (*Spodoptera spp*.),	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)

8	Дини Пъпеши Тиквички, Тикви Краставици	П О	сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma, Spodopetera littoralis*, памукова нощенка *Heliotis armigera*), сем. *Pieridae* – огневки (*Pieris spp*.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
9	Марули и други подобни, Радицио Рукола Валериана Спанак Бял трън Копър Целина Магданоз Резене Пресни билки	П О	Сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma*, *Spodopetera littoralis*, памукова нощенка *Heliotis armigera*, и др.),	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
10	Фасул Зелен фасул Артишок Маслодайна рапица	П	сем. *Noctuidae* – нощенки (*Gortyna spp*., зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma*, египетска памукова нощенка	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)

			Spodopetera littoralis, памукова нощенка *Heliotis armigera*, и др.),									
11	Картофи	П	сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma*, египетска памукова нощенка *Spodopetera littoralis*, памукова нощенка *Heliotis armigera*, и др.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Разтваряне на вторите листа на главното стъбло – Плодовете от първото плодообразуване се сбърчкват, семената потъмняват)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)
12	Цвекло	П	Сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Разлистени 2 листа-пълна зрялост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)
13	Тютюн	П	Сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, многоцветна нощенка *Peridroma saucia)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)

14	Видове от родовете Lysiantus, Tulip, Fresia, Lilium, Карамфил Гербер Роза	П О	Сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma*, *Spodopetera spp*., памукова нощенка *Heliotis armigera* и др.),	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	75-200 (75-200)	100	37,5-100 (37,5-100)	-	0,375-1,0 (0,75-2,0)

Означения: * MPCA - микробиален агент за контрол на вредители
** MPCP - микробният продукт за контрол на вредители

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1366/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: АГРИ 50 ВГ
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: Bacillus thuringiensis ssp. aizawai щам GC-91 (Bta GC-91) 500 г/кг; биопотенциал: 25 000 IU/mg продукт; спори: 3 x 1013 CFU/кг

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер- вал между прилож. дни (мин-макс)	Грама продукт /дка (грама MPCP** hL) Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка (грама MPCA* hl) Мин/макс	(l)	Kg*MPCA/ha Kg**MPCP/ha
	Ябълки Круши	П	Ябълков плодов червей *Cydia pomonella*, сем. *Geometridae* – педомерки (малка зимна педомерка *Operopthera brumata*, голяма зимна педомерка *Hybernia defoliaria, etc.)*, сем. *Yponomeutidae (Hyponomeuta spp*.), сем. *Lymantriidae* – вълнарки (зарзалова	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 53-99 (Разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете – Продукцията е прибрана)	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	-	0,5-1,0 (1-2)

			вълнарка *Orgyia antiqua*), сем.Noctuidae - нощенки *(Orthosia incerta*)									
	Праскови Нектарини Кайсии Череши Сливи	П	Сем. *Tortricidae* – листозавивачки (източен плодов червей *Grapholita molesta*, сливов плодов червей *Laspeyresia funebrana*, и др.), сем. *Gelechiidae* (прасковен клонков молец *Anarsia lineatella)*, сем.*Geometrida*e – педомерки (малка зимна педомерка *Operophthera brumata*), сем.*Lymantriidae* - вълнарки (зарзалова вълнарка *Orgyia antiqua)*, сем. *Yponomeutida*e (сливов молец *Hyponomeuta padellus*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 67-89 (Увяхване на цветовете (повечето венчелистчета са паднали) – Консумативна зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	-	0,5-1,0 (1-2)

	Лимони Портокали Мандарини Клементини	П	сем.Yponomeutidae (*Prays citri*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 67-89	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (200)	100-150	50-100 (100)	-	
	Киви	П	сем. *Tortricidae* листозавивачки (малка лозова листозавивачка *Argyrotaenia pulchellana*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 67-89	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Маслини	П	сем.Yponomeutidae (*Prays oleae*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 69-89	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Ягоди	П О	Сем. *Tortricidae* – листозавивачки (малка лозова листозавивачка *Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp*.), сем. *Noctuidae* нощенки (*Heliothis spp., Spodoptera spp*.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (Втори развит лист – Втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	

	Дини Пъпеши Тиквички Тикви Краставици	П/О	сем. *Noctuidae* – нощенки (зелева нощенка *Mamestra brassicae*, гамозначна нощенка *Autographa gamma*, *Spodopetera littoralis*, памукова нощенка *Heliotis armigera*), сем. *Pieridae* – огневки (*Pieris spp*.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Фасул Зелен фасул Артишок, Маслодайна рапица	П	Сем. *Pyralidae* – огневки (царевичен стъблен пробивач *Ostrinia nubilalis*), сем. Pieridae – огневки (*Pieris spp*.), сем. O*ecophoridae* (*Depressaria spp*.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Марули и други подобни, Радицио Рукола Валериана Спанак Бял трън Копър Целина Магданоз Резене Пресни билки	П О	сем. *Pieridae* – огневки (*Pieris spp*.), сем. *Oecophorida*e (*Depressaria spp*.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)

	Картофи	П	Сем. *Gelechiideae* (картофен молец *Phthorimaea operculella*), сем. *Pieridae* – огневки (*Pieris spp.*), сем.*Oecophoridae* (*Depressaria spp.*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Разтваряне на вторите листа на главното стъбло – Плодовете от първото плодообразуване се сбърчкват, семената потъмняват)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Пипер Патладжан	П/О	Сем. *Pyralide* огневки (*Ostrinia spp.*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Босилек Манголд	П/О	Сем. Noctuidae – нощенки (*Spodoptera spp.*), Сем. *Pyralide* огневки (*Ostrinia spp.*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (200)	50-100	50-100 (100)	-	0,5-1,0 (1-2)
	Царевица	П	Сем. *Pyralidae* огневки (царевичен стъблен пробивач *Ostrinia nubilalis*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (Разтваряне на втори лист – Пълна зрялост: зърната са твърди и лъскави, съдържанието на сухо вещество около 65 %)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-200)	100	50-100 (50-100)	-	0,5-1,0 (1-2)

	Памук	П	Сем.*Noctuidae* - нощенки (памукова нощенка *Heliothis armigera)*, сем. *Gelechiidae (*розов червей *Pectinophora gossypiella*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (Втори същински лист разтворен – Приблизително 90% от семенниците са отворени)	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	120-200 (150-200)	50-80	60-100 (75-100)	-	
	Видове от родове Lysiantus, Tulip, Fresia, Lilium, карамфил, гербер, роза	П/О	сем. *Pieridae* огневки (*Pieris spp*.), сем. *Oecophoridae* (*Depressaria spp*.), сем. *Tortricidae* – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила *Cacoecimorpha pronubana*, Южноафриканската листозавивачка по карамфила *Epichoristodes acerbella*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	75-200 (75-200)	100	37,5-100 (37,5-100)	Доклад остатъци	0,375-1,0 (0,75-2,0)
	Видове от род *Pinus*, ели, видове от род *Populus*	П	*Notodontida* (*Thaumetopoea spp*.), сем. *Lymantriidae* - вълнарки (*Lymantria spp*.), сем. *Arctiidae* (бяла американска пеперуда *Hyphantria cunea)*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 12-89	2-4	7 дни; 3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	-	0,5-1,0 (1-2)

	Тревни площи Спортни терени	П	*Spodoptera spp.*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	Доклад остатъци	0,5-1,0 (1-2)
	Градско озеленяване	П	Сем. *Arctiidae* (бяла американска пеперуда *Hyphantria cunea)*, сем. *Lymantriidae* – (гъботворка *Lymantria dispar*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89	2-4	7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане	100-200 (100-130)	100-150	50-100 (50-65)	Доклад остатъци	0,5-1,0 (1-2)

Означения: * MPCA - микробиален агент за контрол на вредители
** MPCP - микробният продукт за контрол на вредители

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1366/07.06.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупре жде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401 EUH208 - Съдържа *Bacillus thuringiensis ssp. aizawai* щам GC-91. Може да причини алергична реакция.	SP фрази: SP1