**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

## № РД 11-2164

## София, 20.09.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД – 3988/14.09.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с Вх. №№ 12313/31.07.2020 г., 14808/10.09.2020 г. и 11902/20.06.2023 г. от Пробелте С.А.Ю./Probelte S.A.U., Кралство Испания, с упълномощен представител "ХИМКОНСУЛТ" ЕООД, Писма с Вх. № 11621/01.06.2021 г. и № 16007/17.08.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Писмо с вх. № 12313/31.07.2020 г. от "ХИМКОНСУЛТ" ЕООД

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БЕЛТИРУЛ**

Активно вещество: *Bacillus thuringiensis* подвид Kurstaki, щам PB 54 – $32x10^6$ UI/г (160 г/кг)

Производител на продукта за растителна защита: Пробелте С.А.Ю./Probelte S.A.U., Испания

Производител на активното вещество: *Bacillus thuringiensis* подвид Kurstaki, щам PB 54: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на Пробелте С.А.Ю.

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: намокрим прах (ВП)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 40 г, 100 г, 250 г, 500 г, 1 кг и 5 кг торби от OPP/ALUMINIUM/PE, всяка поставена в опаковачна картонена кутия

**Специфични изисквания за употреба:**

1. 1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища
1.2. Да се носят ръкавици и прахозащитна маска при работа с продукта.
1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при прилагане върху семкови, костилкови и черупчести овощни видове (орехи, лешници, бадеми и др.), киви, маслини и цитрусови култури до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество *Bacillus thuringiensis* подвид Kurstaki, щам PB 54, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 1.07.2024 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БЕЛТИРУЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **БЕЛТИРУЛ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Probelte S.A.U./Пробелте С.А.Ю., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/**
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2164/20.09.2023 г.**

Търговско наименование на продукта: **БЕЛТИРУЛ**
Формулация: намокрим прах (ВП)
Концентрация на активно вещество: *Bacillus thuringiensis* подвид Kurstaki, щам PB 54 – 32x$10^6$ UI/г (160 г/кг)

| № | Култура и/или описание (a) | П О или З (b) | Вредител или група вредители, с които се води борба (c) | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) (l) | Забележки (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интервал между прилож. дни (мин) | Грама продукт/дка Мин/макс | Вода л/дка Мин/ макс | Грама активно вещество дка | | |
| 1. | Култури от сем тиквови, с ядлива кора | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera spp.*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 2. | Ягоди | П/О | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 3. | Маруля и други салати вкл. култури от сем. *Brassicaceae* | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia spp.*, *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Домати | П/О | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.); Доматен миниращ молец (*Tutta absoluta*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 мл продукт/дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 5. | Пипер | П/О | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 6. | Костилкови овощни видове | П | Източен плодов червей (*Cydia molesta*); Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*); *Hyponomeuta malinellus*; Пръстено-творка (*Malacosoma neustria*); *Orgya* spp; Розена листозавивачка (*Archips rosanus*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 80-150 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Лозя (винени и десертни сортове) | П | Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*); Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia abbiguella*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

**Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2164/20.09.2023 г.**

Търговско наименование на продукта: **БЕЛТИРУЛ**
Формулация: намокрим прах (ВП)
Концентрация на активно вещество: *Bacillus thuringiensis* подвид Kurstaki, щам PB 54 – 32x$10^6$ UI/г (160 г/кг)

| № | Култура и/или описание (a) | П О или З (b) | Вредител или група вредители, с които се води борба (c) | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) (l) | Забележки (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интервал между прилож. дни (мин) | Грама продукт/дка Мин/макс | Вода л/дка Мин/ макс | Грама активно вещество дка | | |
| 8. | Артишок | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г/дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 9. | Цитрусови култури | П | Цитрусов молец *(Prays citri), Cacoecia rosana* | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 80-150 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Спанак и други подобни | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 11. | Семкови овощни видове | П | Ябълков плодов червей (Cydia pomonella); Ябълков молец (*Hyponomeuta malinellus*); Пръстено-творка (*Malacosoma neustria*); *Orgya* spp Розена листозавивачка (*Archips rosanus, Archips podanus*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 80-150 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Киви | П | *Argyrotaenia pulchellana* | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 13. | Зелеви култури (цъфтящи) | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia spp., Spodoptera* spp.); Бяла зелева пеперуда (*Pieris brassicae*); Зелев молец (*Plutella xylostella*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 3 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 14. | Маслини | П | Маслинов молец (*Prays oleae*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 80-150 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 15. | Памук | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Червена боровинка | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 17. | Малини | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 18. | Къпини | П | Нощенки (*Helicoverpa* spp., *Plusia* spp., *Spodoptera* spp.) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 50-100 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |
| 19. | Черупкови овощни видове (орехи, лешници, бадеми и др.) | П | *Aglaope infausta*; Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*); Розена листозавивачка (*Archips rosanus, Archips podanus*) | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г/дка | 80-150 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | . |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Бананово растение | П | Гъсеници | Конвен-ционална наземна техника | През цялата вегетация | 2 | 7-14 | 50-100 г /дка | 80-150 л/дка | 8-16 г а.в./дка | 2 | |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

**Забележки:**

- БАБХ не носи никаква отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 към настоящата заповед.
- Отговорността за всяка липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 към настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

**Приложение № 3 към Заповед № РД 11-2164/20.03.2023 г.**

| *Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Класификация** | | **Етикетиране** | | | |
| **Клас и категория на опасност** | **Код (ове) на предупрежде-нието (ята) на опасност** | **Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)** | **Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност** | **Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност** | **Специфич-ни предпазни мерки за безопасност** |
| Няма | Няма | Няма | Няма | EUH401<br><br>EUH208 Съдържа *Bacillus thuringiensis* подвид Kurstaki щам PB 54. Може да причини алергична реакция | SP фрази:<br><br>SP1<br>SPe3 |