РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1865

София, 08.08.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 3396/02.08.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № № 20147/27.10.2022 г. и 10123/25.05.2023 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия с упълномощен представител БАСФ ЕООД, Писмо с вх. № 20147/27.10.2022 г. от БАСФ ЕООД и Писмо с вх. № 12314/27.06.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СЕРИФЕЛ**

Активно вещество: *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI 600 - 11% w/w (5,5 x10^{10} cfu/г)

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Корпорейшън/BASF Corporation, САЩ

Производители на активното вещество *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI 600: Информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година по искане на БАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: намокрим прах (ВП)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 500 г ламинирана торба от LDPE/AL/LDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2. Да се носят ръкавици и респираторна маска при работа с продукта.
1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при дребни ягодоплодни култури (къпини и малини).

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 16.09.2027 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СЕРИФЕЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СЕРИФЕЛ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1865/08.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **СЕРИФЕЛ**

Формулация: намокрим прах (ВП)

Концентрация на активното вещество: *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI 600 - 11% w/w (5,5 x10^{10} cfu/г)

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни мин/ макс	Грама продукт/дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество/дка		
1	Лозя (десертни сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67-89 (70% опадане на ресите – плодът е готов за беритба)	10	7	50 г/дка	10-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	3	
2	Лозя (винени сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67-90 (70% опадане на ресите – стареене)	10	7	50 г/дка	10-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	3	
3	Ягоди	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-89 (първи цветоноси на дъното на розетката – втора реколта)	6	5	50 г/дка	20 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	

4	Малини Къпини	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89	6	5	50 г/дка	30 л/дка	5,5 г а. в./дка	3	
5	Домати Пипер Патладжан	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)	6	5	50 г/дка	30 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	
6	Домати Пипер Патладжан	П	Кафяви петна/алтернария (*Alternaria solani, Alternaria alternata*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)	6	5-10	25 г/дка	30–100 л/дка	2,75 г а. в./дка	1	
7	Гъби	О/З	Триходерма (*Trichoderma aggressivum*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-49	1	-	2,5 г /дка/100 кг субстрат	275 мл/100 кг субстрат	0,25 г а. в./100 кг субстрат	-	
8	Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)	6	5	50 г/дка	20 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1865/08.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **СЕРИФЕЛ**

Формулация: намокрим прах (ВП)

Концентрация на активното вещество: *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI 600 - 11% w/w (5,5 x10^{10} cfu/г)

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни мин/ макс	Грама продукт/ дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество/ дка		
1	Бамя	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-89	6	5	50 г/дка	30 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	
2	Домати Пипер Патладжан	О	Кафяви петна/алтернария (*Alternaria solani, Alternaria alternata*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна	6	5-10	25 г/дка	30–100 л/дка	2,75 г а. в./дка	1	
3	Марули Рукола Дива рукола Спанак	П/О	Склеротийно гниене/Бяло гниене (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor)*, ризоктония (*Thanatephorus cucumeris*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 01-18	5	5	50 г/дка	20-30 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	Baby leaf (реколтата до 6-8 същински листа)

4	Киви	П	Сиво гниене (теломорф: *Botryotinia fuckeliana*) бактериоза (*Pseudomonas syringae pv. actidiae*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 55-98	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	
5	Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол	П	Стемфилиум (*Stemphilium* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 55-98 (видими първите цветчета на централното стъбло – растенията са сухи)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	
			Бактериоза (*Pseudomonas* sp*; Xanthomonas* sp.) кафяви петна/алтернария (*Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola*)		BBCH 13-89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване)							
6	Броколи	П	Стемфилиум (*Stemphilium* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 41-48 (начало на развитие на страничните пъпки - 80% от зелетата напълно затворени)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	
			Бактериоза (*Pseudomonas* sp*; Xanthomonas* sp.), кафяви петна/алтернария (*Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola*)		BBCH 13-89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване)							

7	Грах	П	Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*), аскохитоза (*Didymella pisi*), антракноза (*Glomerella cingulata*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-89 (пет листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват пет мустачета)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	1	
8	Фъстъци	П	Склеротиния (*Sclerotinia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-89 (разлистени 5 листа-пълна зрялост)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	
9	Тикви Твърдокора, едроплодна (бяла), мускатна (цигулка), свинска, смокинова, кратуни	П/О	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*), Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*), кафяви петна/алтернария (*Alternaria cucumerina*), ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	
10	Пъпеши	П	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*), кафяви петна/ алтернария *(Alternaria cucumerina*)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	
		П/О	Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*), ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)									

11	Диня	П	Брашнеста мана *Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*), алтернария *(Alternaria cucumerina*	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	
12	Диня	П/О	Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*), ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	
13	Краставици Тиквички	П/О	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*), черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*), кафяви петна/алтернария (*Alternaria cucumerina*), ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	
14	Ягоди	П/О	Фитофторно гниене (*Phytophthora cactorum*), увяхване на разсада (*Phytophthora* sp.), ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	До ВВСН 69 (край на цъфтежа)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	

			Брашнеста мана (*Podosphaera macularis*)		При първи симптоми							
15	Растения от род коноп Cannabis (Канабис)	П/О	Сиво гниене (*Botryotinia fuckeliana*)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	1	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. БАБХ не носи никаква отговорност при евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Отговорността за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето прилагащо продукта.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреж де-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктогра мата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401 EUH208 - Съдържа *Bacillus amiloliquefacien*s. Може да причини алергична реакция	SP фрази: SP1 SPe3