РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

1.3.2024 г.

X РД11-565/01.03.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 713/12.02.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 14085/15.07.2022 г. от Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия, упълномощен представител – Химконсулт ЕООД и Писмо от Центъра за оценка на риска по хранителната верига с вх. № 25443/22.12.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ТРИАНУМ П

Активно вещество: *Trichoderma harzianum, щам T-22* (*Trichoderma harzianum strain T-22*) – $1x10^{12}$ cfu/кг; 10 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия

Производители на активното вещество *Trichoderma harzianum, щам T-22:* Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 г, 500 г и 5 кг торба от алуминиево фолио в картонена опаковка

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло и филтърна маска по време на работа с продукта и при непосредствен контакт с културите след третирането.

1.3. Опасен за пчелите. Да не се прилага в период на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество: *Trichoderma harzianum, щам T-22,* съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.04.2026 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) ТРИАНУМ П се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ ТРИАНУМ П съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

29.2.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

1.3.2024 г.

X РД11-565/01.03.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: ТРИАНУМ П
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно/и вещество/а: *Trichoderma harzianum*, щам Т-22 ($1x10^{12}$ cfu/кг; 10 г/кг)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож. (дни)	Кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка Мин/макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Краставици, моркови, зелен фасул, сенполия (африканска теменужка), домати, хризантеми, марули, марули, тревни площи	О/З	*Pythium* spp. по краставица, моркови, зелен фасул, сенполия (африканска теменужка); *Fusarium* spp. по домати и хризантеми; *Rhizoctonia* spp. по марули;	Третиране на почвата Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, засяване, засаждане, разсаждане BBCH 00-03 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
		О/З		Напояване	Култивиране Всички сезони BBCH 00-99 При температури на почвата > 8C	5	70	0,25-0,5 кг/дка	100-120 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване				0,1-0,25 кг/дка	100-120 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

			Sclerotinia spp. по тревни площи	Капково напояване	Култивиране Всички сезони ВВСН 00-99 При температури на почвата > 8С	5	70	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	Не многогодишни култури
				Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-Лято-Есен	5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-2500 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Много-годишни култури
		П		Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	5	70	0,25-0,5 кг/дка	70-160 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване		5	70	0,1-0,25 кг/дка	70-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване		5	70	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	Не многогодишни култури
				Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-Лято-Есен	5	70	0,3-1 кг/1000 растения	1000-2500 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Многогодиш-ни култури Напояване около дупката на растението
2	Моркови Ряпа	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00	1	-	0,1-0,25 кг/дка	5-20 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
		П			Култивиране ВВСН 00	1	-	0,25-0,5 кг/дка	5-20 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи/цяло поле
					Култивиране ВВСН 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	5-20 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	5-20 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Отглеждане в лехи/цяло поле
3	Целина Праз	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.,	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, засяване, разсаждане ВВСН 00 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	

					Култивиране BBCH 00-09 Всички сезони	1	-	0,1-0,25 кг/дка	50-60 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
					Култивиране BBCH 00-09 Всички сезони	1	-	0,25-0,5 кг/дка	70-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П			Култивиране BBCH 00-09 Пролет-лято При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-40 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	30-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
4	Зеле Карфиол	О/З	*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.,	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане BBCH 00-07 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг/дка 2-ро приложение -0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
		П			Култивиране BBCH 00-07 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П			Култивиране BBCH 00-07 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-40 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
5	Пъпеши, Краставици Домати Пипер	О/З	*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.,	Пръскане при сеитба/ Напояване Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане BBCH 00-51 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг/дка 2-ро приложение -0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
				Капково напояване	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони	12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	

		П		Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Всички сезони	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Напояване		1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-50 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
6	Ягоди Ягодоплод-ни култури Къпина Малина Лозя	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане ВВСН 00-03 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг /дка 2-ро приложение -0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
				Напояване	Култивиране Всички сезони ВВСН 00-99 При температури на почвата > 8С	5	70	0,25-0,5 кг/дка	100-120 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване				0,1-0,25 кг/дка	100-120 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване	Култивиране Всички сезони ВВСН 00-99 При температури на почвата > 8С	5	70	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	5	70	0,25-0,5 кг/дка	70-160 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П		Напояване		5	70	0,1-0,25 кг продукт/дка	70-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
		П		Капково напояване		5	70	0,015-0,03 кг /1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
7	Марули	О/З	*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане ВВСН 00-09 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг/дка 2-ро приложение -0,75 кг продукт/дка	1000-1300 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	

					Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони	1	-	0,25-0,5 кг /дка	20-100 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
					Култивиране BBCH 11-19	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
		П			Култивиране BBCH 11-19 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
					Култивиране BBCH 11-19 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
8	Лук	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp..	Пръскане Конвен- ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане BBCH 00-09 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг продукт/дка	1000-1300 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
		О/З			Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-100 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		О/З			Култивиране BBCH 11-19	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
		П			Култивиране BBCH 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
					Култивиране BBCH 11-19 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

9	Фасул Грах	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство ВВСН 00-09 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка		
		П		Пръскане или капково напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка		Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-50 л/дка	2,5-5 г а.в./дка		Култивиране в лехи
10	Декоративни луковични растения	О/З	*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00-09 Всички сезони	1	-	0,1-0,25 кг/дка	1000-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка		Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	2500-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка		Култивиране в лехи/цяло поле
		П		Пръскане при засяване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	50-60 л/дка	1-2,5 г а.в./дка		Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	60-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка		Култивиране в лехи/цяло поле
11	Декоративни растения		*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, производство на посадъчен материал ВВСН 00-13 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка		
12	Декоратив-ни култури, цъфтящи и	О/З	*Fusarium* spp.,	Пръскане при засяване/ напояване	Семепроизводство, производство на посадъчен материал	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи

	зелени растения		*Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 00-13 Всички сезони	4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване	Култивиране ВВСН 00-09	12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
						4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
13	Декоратив-ни култури, цъфтящи и зелени растения Рози	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00-09	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
						4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване		12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
						4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
14	Декоративни дървета и храсти, разсадници	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, производство на посадъчен материал, засаждане ВВСН 00-59	4	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	

				Напояване	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони	5	70	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване		5	70	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Напояване		5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	2500-5000 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
		П		Напояване	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен	5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-2500 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
15	Етерично маслени и лечебни растения, билки, настойки	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.	Пръскане/ Напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-1300 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
16	Семе-производство и разсадо-производство на полски, зеленчукови култури, билки. Производство на посадъчен материал от овощни култури, билки и декоративни култури	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8С	5	70	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Пръскане/ Напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8С	5	70	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Капково напояване	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8С	12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	

		П		Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	5	70	0,25-0,5 кг продукт/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи/цялото поле
17	Семкови и костилкови овощни видове	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Пръскане	Производство на посадъчен материал BBCH 00-13 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
				Пръскане при засаждане/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Засаждане, засяване BBCH 00-99 Всички сезони	5	70	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника		5	70	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Напояване		5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-5000 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
				Капково напояване		12	28	0,015-0,03 кг /1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Напояване	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-5000 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията

18	Тревни култури Окосени пасища		*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Сеитба, култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	12	14	1-во приложение - 0,3 кг/дка 2-ро приложение - 0,15 кг/дка	25-50 л/дка	1-во приложение - 3 г а.в./дка; 2-ро и следващи приложения - 1,5 г а.в./дка	-	Препоръчи-телно е да се прилага напояване с чиста вода след прилагане на продукта

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

1.3.2024 г.

X РД11-565/01.03.2024

Приложение № 2 за разрешените миним...
употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: ТРИАНУМ П
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно/и вещество/а: *Trichoderma harzianum,* щам Т-22 ($1x10^{12}$ cfu/кг; 10 г/кг)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер-вал м/у прилож. (дни)	Кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/ дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1	Моркови	О/З	*Sclerotinia* spp. по моркови	Третиране на почвата Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство Култивиране BBCH 00-03 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	

		О/З		Напояване	Култивиране Всички сезони ВВСН 00-99 При температури на почвата > 8С	5	70	0,25-0,5 кг/дка	100-120 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване				0,1-0,25 кг/дка	100-120 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване	Култивиране Всички сезони ВВСН 00-99 При температури на почвата > 8С	5	70	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	Не многогодишни култури
				Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-Лято-Есен	5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-2500 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Много-годишни култури
		П		Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	5	70	0,25-0,5 кг/дка	70-160 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване		5	70	0,1-0,25 кг/дка	70-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване		5	70	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	Не многогодишни култури
				Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-Лято-Есен	5	70	0,3-1 кг/1000 растения	1000-2500 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Многогодиш-ни култури Напояване около дупката на растението
2	Моркови Ряпа	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00	1	-	0,1-0,25 кг/дка	5-20 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
		П			Култивиране ВВСН 00	1	-	0,25-0,5 кг/дка	5-20 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи/цяло поле
					Култивиране ВВСН 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	5-20 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	5-20 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Отглеждане в лехи/цяло поле

3	Целина Праз	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, засяване, разсаждане ВВСН 00 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
					Култивиране ВВСН 00-09 Всички сезони	1	-	0,1-0,25 кг/дка	50-60 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
					Култивиране ВВСН 00-09 Всички сезони	1	-	0,25-0,5 кг/дка	70-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П			Култивиране ВВСН 00-09 Пролет-лято При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-40 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	30-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
4	Зеле Карфиол	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане ВВСН 00-07 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг/дка 2-ро приложение -0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
		П			Култивиране ВВСН 00-07 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П			Култивиране ВВСН 00-07 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-40 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

5	Пъпеши, Краставици Домати Пипер	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане при сеитба/ Напояване Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство Разсаждане BBCH 00-51 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг/дка 2-ро приложение -0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
				Капково напояване	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони	12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Напояване	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Напояване		1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-50 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
6	Ягоди Ягодоплод-ни култури Къпина Малина Лозя	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, производство на посадъчен материал, разсаждане, засаждане BBCH 00-03 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг /дка 2-ро приложение -0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
				Напояване	Култивиране Всички сезони BBCH 00-99 При температури на почвата > 8C	5	70	0,25-0,5 кг/дка	100-120 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване				0,1-0,25 кг/дка	100-120 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване	Култивиране Всички сезони BBCH 00-99 При температури на почвата > 8C	5	70	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Напояване	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен	5	70	0,25-0,5 кг/дка	70-160 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П		Напояване		5	70	0,1-0,25 кг продукт/дка	70-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

		П		Капково напояване	При температури на почвата > 8С	5	70	0,015-0,03 кг /1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
7	Марули	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане ВВСН 00-09 Всички сезони	2	14	1-во приложение -1,5 кг/дка 2-ро приложение -0,75 кг продукт/дка	1000-1300 л/дка	1-во приложение -15 г а.в./дка 2-ро приложение -7,5 г а.в./дка	-	
					Култивиране ВВСН 11-19 Всички сезони	1	-	0,25-0,5 кг /дка	20-100 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
					Култивиране ВВСН 11-19	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
		П			Култивиране ВВСН 11-19 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
					Култивиране ВВСН 11-19 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8С	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
8	Лук	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, разсадо-производство, разсаждане ВВСН 00-09 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг продукт/дка	1000-1300 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
		О/З			Култивиране ВВСН 11-19 Всички сезони	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-100 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		О/З			Култивиране ВВСН 11-19	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-100 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

		П			Култивиране BBCH 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
					Култивиране BBCH 11-19 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
9	Фасул Грах	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен- ционална наземна техника	Семепроизводство BBCH 00-09 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	2500-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка		
		П		Пръскане или капково напояване Конвен- ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	20-50 л/дка	1-2,5 г а.в./дка		Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	20-50 л/дка	2,5-5 г а.в./дка		Култивиране в лехи
10	Декоративни луковични растения	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен- ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-09 Всички сезони	1	-	0,1-0,25 кг/дка	1000-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка		Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	2500-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка		Култивиране в лехи/цяло поле
		П		Пръскане при засяване Конвен- ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	1	-	0,1-0,25 кг/дка	50-60 л/дка	1-2,5 г а.в./дка		Култивиране в редове
						1	-	0,25-0,5 кг/дка	60-80 л/дка	2,5-5 г а.в./дка		Култивиране в лехи/цяло поле

11	Декоративни растения		*Sclerotinia* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, производство на посадъчен материал BBCH 00-13 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка		
12	Декоратив-ни култури, цъфтящи и зелени растения	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, производство на посадъчен материал BBCH 00-13 Всички сезони	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
						4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване	Култивиране BBCH 00-09	12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
						4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
13	Декоратив-ни култури, цъфтящи и зелени растения Рози	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-09	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
						4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Капково напояване		12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Пръскане при засяване/ напояване	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен	4	14	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи

				Конвен-ционална наземна техника	При температури на почвата > 8С	4	14	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
14	Декоративни дървета и храсти, разсадници	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Семепроизводство, производство на посадъчен материал, засаждане ВВСН 00-59	4	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
				Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Всички сезони	5	70	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Напояване		5	70	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове
				Напояване		5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	2500-5000 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
		П		Напояване	Култивиране ВВСН 00-99 Пролет-лято-есен	5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-2500 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
15	Етерично маслени и лечебни растения, билки, настойки	О/З	*Sclerotinia* spp.	Пръскане/ Напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00-99 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-1300 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
16	Семе-производство и разсадо-производство на полски, зеленчукови	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране ВВСН 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8С	5	70	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

	култури, билки. Производство на посадъчен материал от овощни култури, билки и декоративни култури			Пръскане/ Напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8C	5	70	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Капково напояване	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8C	12	28	0,015-0,03 кг/1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	5	70	0,25-0,5 кг продукт/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи/цялото поле
17	Семкови и костилкови овощни видове	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Пръскане	Производство на посадъчен материал BBCH 00-13 Всички сезони	2	14	1-во приложение - 1,5 кг/дка 2-ро приложение - 0,75 кг/дка	1000-5000 л/дка	1-во приложение - 15 г а.в./дка 2-ро приложение - 7,5 г а.в./дка	-	
				Пръскане при засаждане/ напояване Конвен-ционална наземна техника	Засаждане, засяване BBCH 00-99 Всички сезони	5	70	0,25-0,5 кг/дка	1000-5000 л/дка	2,5-5 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Пръскане при засяване/ напояване Конвен-ционална наземна техника		5	70	0,1-0,25 кг/дка	500-2500 л/дка	1-2,5 г а.в./дка	-	Култивиране в редове

				Напояване		5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-5000 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
				Капково напояване		12	28	0,015-0,03 кг /1000 растения		0,15-0,3 г а.в./1000 растения	-	
		П		Напояване	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температури на почвата > 8C	5	70	0,3-1 кг/ 1000 растения	1000-5000 л/дка	3-10 г а.в./1000 растения	-	Напояване около дупката на растенията
18	Тревни култури Окосени пасища		*Rhizoctonia* spp., *Microdochium* spp.	Пръскане Конвен-ционална наземна техника	Сеитба, култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	12	14	1-во приложение - 0,3 кг/дка 2-ро приложение - 0,15 кг/дка	25-50 л/дка	1-во приложение - 3 г а.в./дка; 2-ро и следващи приложения - 1,5 г а.в./дка	-	Препоръчи-телно е да се прилага напояване с чиста вода след прилагане на продукта

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

X РД11-565/01.03.2024

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупре жде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401 EUH208 Съдържа *Trichoderma harzianum*. Може да причини алергична реакция	SP фрази: SP1 SPe8