РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

1.3.2024 г.

X РД11-567/01.03.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 713/12.02.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 14080/15.07.2022 г. от Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия, упълномощен представител – Химконсулт ЕООД и Писмо от Центъра за оценка на риска по хранителната верига с вх. № 25442/22.12.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ТРИАНУМ Г

Активно вещество: *Trichoderma harzianum, щам T-22* (*Trichoderma harzianum strain T-22*) – 1,5x10^{11} cfu/кг; 10 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия

Производители на активното вещество *Trichoderma harzianum, щам T-22*: Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: гранули (ГР)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката:

- 5 кг торба от алуминиево фолио в картонен контейнер;
- 20 кг чувал от многослойна полипропиленова тъкан

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло и филтърна маска по време на работа с продукта и при непосредствен контакт с културите след третирането.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество: *Trichoderma harzianum, щам T-22*, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.04.2026 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) ТРИАНУМ Г се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ ТРИАНУМ Г съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Коперт Б. В./Koppert B. V., Нидерландия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1.3.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

1.3.2024 г.

X РД11-567/01.03.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: ТРИАНУМ Г
Формулация: гранули (ГР)
Концентрация на активно/и вещество/а: : *Trichoderma harzianum, щам T-22* – 1,5x10^{11} cfu/кг; 10 г/кг

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож. (дни)	Кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка Мин/макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Краставици, моркови, зелен фасул, сенполия (африканска теменужка), домати, хризантеми, марули, броколи, тревни площи	П/О /З	*Pythium* spp. по краставица, моркови, зелен фасул, сенполия (африканска теменужка) *Fusarium* spp. по домати и хризантеми	Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8C	1	-	1,0-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
				Площно третиране		1	-	2,5-5 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка		Култивиране в лехи
				Смесване със субстрата		5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3		Прилагане при всяко презасаждане

			Rhizoctonia spp. по маруля и броколи; *Sclerotinia* spp. по тревни площи	Добавяне в дупката за растението		1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения		Не многогодишни култури
				Добавяне в дупката за растението		1	-	3-10 кг/1000 растения (0,3-10 г растение)	-	0,03-0,1 кг/1000 растения		Многогодишни култури
2	Моркови, ряпа	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Площно третиране	Засяване ВВСН 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1,0-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
		О/З				1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П				1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
3	Целина, праз	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, засяване, разсаждане, ВВСН 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	-
		П		Площно третиране		1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П		Площно третиране		1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
4	Зеле, карфиол	О/З	*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.,	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане ВВСН 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	
		П		Площно третиране		1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
5	Пъпеши, краставици, домати, пипер	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.,	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане, презасаждане ВВСН 00-51 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	

		О/З		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-51 При температури на почвата > 8C	1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято При температури на почвата > 8C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
6	Ягоди, ягодоплодни култури, къпина, малина, лозя	П/О /З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.,	Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
				Площно третиране		1	-	2,5-5 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Смесване със субстрата		5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагайте при всяко повторно засаждане
				Добавяне в дупката за растението		1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	
7	Фасул, грах	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.,	Смесване със субстрата	Семепроизводство, презасаждане BBCH 00-51 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	
		О/З		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00 При температури на почвата > 8C	1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	

		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято При температури на почвата > 8C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в редове
8	Марули	О/З	*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1		1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в бразда
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в бразда
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
9	Лук	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	

		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в бразда
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка		Засаждане в бразда
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
10	Декоративни луковични растения	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.	Смесване със субстрата	Размножаване BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,375-0,75 кг/м^3	-	3,75-7,5 г/м^3	-	
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Отглеждане в редове
		П		Смесване със субстрата	Размножаване презасаждане BBCH 00 Пролет-есен При температура на почвата >8°C	1	-	0,375-0,75 кг/м^3	-	3,75-7,5 г/м^3	-	

		П		Площно третиране	Размножаване, презасаждане BBCH 00 Пролет-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Отлеждане в редове
11	Декоративни растения - цветни култури и зелени растения	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, производство на посадъчен материал BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при сеитба и разсаждане
		О/З		Смесване със субстрата	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
12	Декоративни растения – цъфтящи и зелени растения, рози	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.	Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
		О/З		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-51 При температура на почвата >8°C	1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	

		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
13	Декоративни дървета и храсти	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, производство на посадъчен материал и култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние -7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Прилагане при всяко презасаждане
		П		Смесване със субстрата	Семепроизводство, производство на посадъчен материал и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложен ие -7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразди

		П		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	3-10 кг/1000 растения (3-10 г/растение)	-	0,03-0,1 кг/1000 растения	-	
14	Етерично маслени и лечебни растения, билки, настойки	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.	Смесване със субстрата	Размножаване, засяване, разсаждане BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	
15	Полски, зеленчукови и овощни култури, билки и декоративни култури	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		О/З		Добавяне в дупката за растението	Размножаване и култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-10 кг/1000 растения		10-100 г/1000 растения	-	
		П		Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане

		П		Площно третиране	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразди
		П		Площно третиране	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
16	Семкови и костилкови овощни видове	О/З	*Fusarium* spp., *Pythium* spp.	Смесване със субстрата	Производство на посадъчен материал, пресаждане BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразди
		П		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	3-10 кг/1000 растения (3-10 г/растение)	-	0,03-0,1 кг/1000 растения	-	

17	Тревни култури, окосени пасища	П	*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Sclerotinia* spp.	Площно третиране	Сеитба, култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	12	14	1-во приложение -3 кг/дка; 2-ро и следващи приложения - 1,5 кг/дка	-	1-во приложе-ние - 30 г а.в/дка; 2-ро и следващи приложе-ния - 15 г а.в./дка	-	Препоръчва се след нанасяне да се извърши напояване с чиста вода

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

1.3.2024 г.

X РД11-567/01.03.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: ТРИАНУМ Г
Формулация: гранули (ГР)
Концентрация на активно/и вещество/а: : *Trichoderma harzianum, щам T-22* – 1,5x10^{11} cfu/кг; 10 г/кг

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож. (дни)	Кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка Мин/макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Моркови	П/О/З	*Sclerotinia* spp.	Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони	1	-	1,0-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
				Площно третиране		1	-	2,5-5 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка		Култивиране в лехи

				Смесване със субстрата	При температури на почвата > 8С	5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3		Прилагане при всяко презасаждане
2	Моркови, ряпа	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Площно третиране	Засяване ВВСН 00 Всички сезони При температура на почвата >8°С	1	-	1,0-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
		О/З				1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П				1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
3	Целина, праз	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, засяване, разсаждане, ВВСН 00 Всички сезони При температура на почвата >8°С	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	-
		П		Площно третиране		1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П		Площно третиране		1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
4	Зеле, карфиол	О/З	*Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане ВВСН 00 Всички сезони При температура на почвата >8°С	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	
		П		Площно третиране		1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
5	Пъпеши, краставици, домати, пипер	О/З	*Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане, презасаждане ВВСН 00-51 Всички сезони При температура на почвата >8°С	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	

		О/З		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-51 При температури на почвата > 8C	1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято При температури на почвата > 8C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
6	Ягоди, ягодоплодни култури, къпина, малина, лозя	П/О /З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температури на почвата > 8C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
				Площно третиране		1	-	2,5-5 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
				Смесване със субстрата		5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагайте при всяко повторно засаждане
				Добавяне в дупката за растението		1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	
7	Фасул, грах	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, презасаждане BBCH 00-51 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	
		О/З		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00 При температури на почвата > 8C	1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	

		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00 Пролет-лято При температури на почвата > 8C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в редове
8	Марули	О/З	*Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1		1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в бразда
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в бразда
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг /дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
9	Лук	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство, разсаждане BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,75 кг/м^3	-	7,5 г/м^3	-	

		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Засаждане в бразда
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка		Засаждане в бразда
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 11-19 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Засаждане в лехи
10	Декоративни луковични растения	О/З	*Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Размножаване BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	0,375-0,75 кг/м^3	-	3,75-7,5 г/м^3	-	
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 00 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Отглеждане в редове
		П		Смесване със субстрата	Размножаване, презасаждане BBCH 00 Пролет-есен При температура на почвата >8°C	1	-	0,375-0,75 кг/м^3	-	3,75-7,5 г/м^3	-	

		П		Площно третиране	Размножаване, презасаждане BBCH 00 Пролет-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Отлеждане в редове
11	Декоративни растения - цветни култури и зелени растения	О/З	*Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, производство на посадъчен материал BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при сеитба и разсаждане
		О/З		Смесване със субстрата	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
12	Декоративни растения – цъфтящи и зелени растения, рози	О/З	*Sclerotinia* spp.	Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
		О/З		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-51 При температура на почвата >8°C	1	-	1 кг/1000 растения (1 г растение)	-	0,01 кг/1000 растения	-	

		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразда
13	Декоративни дървета и храсти	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, производство на посадъчен материал и култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложе-ние -7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		О/З		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Прилагане при всяко презасаждане
		П		Смесване със субстрата	Семепроизводство, производство на посадъчен материал и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	5	70	1-во приложение - 0,75 кг/м3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложен ие -7,5 г/м3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в брази

		П		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	3-10 кг/1000 растения (3-10 г/растение)	-	0,03-0,1 кг/1000 растения	-	
14	Етерично маслени и лечебни растения, билки, настойки	О/З	*Sclerotinia* sp.	Смесване със субстрата	Размножаване, засяване, разсаждане BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	2	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	
15	Полски, зеленчукови и овощни култури, билки и декоративни култури	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		О/З		Добавяне в дупката за растението	Размножаване и култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	1	-	1-10 кг/1000 растения		10-100 г/1000 растения	-	
		П		Смесване със субстрата	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложения - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане

		П		Площно третиране	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразди
		П		Площно третиране	Семепроизводство, разсадопроизводство и култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	2,5-5,0 кг/дка	-	25-50 г а.в./дка	-	Култивиране в лехи
16	Семкови и костилкови овощни видове	О/З	*Rhizoctonia* spp., *Sclerotinia* spp.	Смесване със субстрата	Производство на посадъчен материал, пресаждане BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	6	14	1-во приложение - 0,75 кг/м^3; 2-ро и следващи приложения - 0,375 кг/м^3	-	1-во приложение - 7,5 г/м^3; 2-ро и следващи приложе-ния - 3,75 г/м^3	-	Прилагане при всяко презасаждане
		П		Площно третиране	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	1-2,5 кг/дка	-	10-25 г а.в./дка	-	Култивиране в бразди
		П		Добавяне в дупката за растението	Култивиране BBCH 00-99 Пролет-лято-есен При температура на почвата >8°C	1	-	3-10 кг/1000 растения (3-10 г/растение)	-	0,03-0,1 кг/1000 растения	-	

17	Тревни култури, окосени пасища	П	*Rhizoctonia* spp., *Microdochium* spp.	Площно третиране	Сеитба, култивиране BBCH 00-99 Всички сезони При температура на почвата >8°C	12	14	1-во приложение -3 кг/дка; 2-ро и следващи приложения - 1,5 кг/дка	-	1-во приложе-ние - 30 г а.в/дка; 2-ро и следващи приложе-ния - 15 г а.в./дка	-	Препоръчва се след нанасяне да се извърши напояване с чиста вода

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

X РД11-567/01.03.2024 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупре жде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401 EUH208 Съдържа *Trichoderma harzianum*. Може да причини алергична реакция	SP фрази: SP1