РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-1448/04.06.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 60 ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-2715/27.05.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 8148/24.04.2023 г. от „ФМС Агро България“ ЕООД и Писмо с вх. № 8308/16.04.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ТЕКОРЛА**

Активни вещества: хлорантранилипрол (chlorantraniliprole) - 51,7 г/л

Производител на продукта за растителна защита: ФМС Интернешънъл Швейцария Сарл/ FMC International Switzerland Sarl

Производител на активното вещество хлорантранилипрол: ФМС Интернешънъл Швейцария Сарл/ FMC International Switzerland Sarl

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 300 мл, 500 мл, 1 л, 3 л и 5 л бутилки/туби от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо цялото тяло.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка.

(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, при овощни семкови (ябълка, круша, дюля, мушмула) в ВВСН 71-87 с доза на приложение (1 ×4 г а.в./дка) с цел опазване на водните организми и да не се прилага продукта върху дренирани почви.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, при овощни семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля, мушмула) в ВВСН 71-87 с доза на приложение (1 × 6 г а.в./дка) с цел опазване на водните организми и да не се прилага продукта върху дренирани почви.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, при овощни костилкови видове (праскова, нектарина, кайсия, слива) в ВВСН 73-87 с доза на приложение (1 × 4 г а.в./дка) с цел опазване на водните организми и да не се прилага продукта върху дренирани почви.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, при овощни костилкови видове (праскова, нектарина, кайсия, слива) в ВВСН 73-87 с доза на приложение (1 × 6 г а.в./дка) с цел опазване на водните организми и да не се прилага продукта върху дренирани почви.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до поврхностни води, при лозя (винени сортове), ВВСН 57-83 (1 × 5,4 г а.в./дка) и лозя (десертни сортове), ВВСН 71-85 (2 × 4,32 г а.в./дка), с цел опаване на водните организми.

1.8. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, при лозя (винени сортове), ВВСН 57-83 (1 × 3,5 г а.в./дка) и лозя (десертни сортове), ВВСН 57-85 (1 × 4,32 г а.в./дка) и ВВСН 57-85 (1 × 3,5 г а.в./дка), с цел опазване на водните организми.

1.9. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра от повърхностни води, при картофи (2 × 3,5 г а.в./дка), с цел опазване на водните организми.

1.10. С цел опазване на водните организми, да не се прилага продукта върху дренирани почви, при картофи (2 × 3,5 г а.в./дка).

1.11. С цел опазване на подпочвените води продуктът да бъде прилаган: един път на три години при доза на приложение от 6 г а.в./дка за семкови и костилкови овощни видове, сливи и орех, един път на две години при доза на приложение от 4 г а.в./дка за семкови и костилкови овощни видове, сливи и орех, един път на две години при доза на приложение от 5,4 г а.в./дка (ВВСН 57-83) за винени сортове грозде/лозя и един път на две години при доза на приложение от 4,32 г а.в./дка (ВВСН 71-85) за десертни сортове грозде/лозя.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество хлорантранилипрол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.12.2025 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна

защита **ТЕКОРЛА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ТЕКОРЛА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „ФМС Агро България‘‘ ЕООД.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1448/04.06.2024

Приложение към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ТЕКОРЛА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: хлорантранилипрол - 51,7 г/л

	Култура и/или описание	ПО/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт / дка Мин/макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля мушмула)	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*), Източен плодов червей (*Cydia molesta*), Ябълков пъстър миниращ молец (*Phyllonorycter blancardella*), Ябълков миниращ листов молец (*Phyllonorycter corylifoliella*), Плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), Кръгломиниращ молец (*Leucoptera scitella*), Argyrotaenia ljungiana, Ягодоплодна листозавивачка (*Pandemis ribeana*), Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка (*Pandemis heparana*)	Механизирана наземна техника	BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване-беритбена зрялост) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
						1	-	70-80 мл продукт /дка	70-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка втора година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
2	Костлкови овощни видове (праскова,	П	Източен плодов червей (*Cydia molesta*), Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза-оцветяването се развива)	1	-	70-120 мл продукт /дка	80-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)

	нектарина, кайсия)				Април - септември	1	-	70-80 мл продукт /дка	80-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка втора година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
3	Слива	П	Малка зимна педомерка (*Operophtera brumata*), Източен плодов червей (*Cydia molesta*)	Механизирана наземна техника	ВВСН 73-87 (вторично окапване на завръза-беритбена зрялост) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
						1	-	70-80 мл продукт /дка	70-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка втора година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
4	Орех	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*)	Механизирана наземна техника	ВВСН 73-87 Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка	100-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	21	Приложение на всяка трета година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
						1	-	70-80 мл продукт / дка	100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	21	Приложение на всяка втора година. Минимална доза 3,5 г а.в./дка (70 мл продукт/дка)
5	Лозя (винени сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) ВВСН 69-83 (край на цъфтежа-зърната формират цвят) Май-август	1	-	60-108 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,0-5,4 г а.в./дка	30	Приложение на всяка втора година. Минимална доза 3,0 г а.в./дка (60 мл продукт/дка). Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (ВВСН 60-69).
6	Лозя (винени сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 71-83 (завръз:младите плодове започват да наедряват,остатъците от цветовете опадат-зърната формират цвят) Юни-август	1	-	60-108 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,0-5,4 г а.в./дка	30	Минимална доза 3,0 г а.в./дка (60 мл продукт/дка).

7	Лозя (десертни сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) BBCH 69-85 (край на цъфтежа-омекване на зърната) Май-август	1	-	60-86,4 мл продукт /дка	70-120 л/дка	3,0-4,32 г а.в./дка	3	Минимална доза 3,0 г а.в./дка (60 мл продукт/дка). Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
8	Лозя (десертни сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-85 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване на зърната) Юни-октомври	2	10 дни	60-86,4 мл продукт /дка	70-120 л/дка	3,0-4,32 г а.в./дка	3	Приложение на всяка втора година. Минимална доза 3,0 г а.в./дка (60 мл продукт/дка).
9	Царевица (зърно и силаж) Сладка царевица	П	Царевичен стъблопробивач (*Ostrinia nubilalis*), Видове нощенки (*Sesamia nonagrioides*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exiqua*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 20-55 (разтваряне на десети лист-средната част на метлицата започва да се разтваря) Май-август	1	-	40-60 мл продукт /дка	10-80 л/дка	2,0-3,0 г а.в./дка	-	Минималната препоръчителна доза е 2,0 г а.в./дка (40 мл продукт/дка).
10	Царевица (зърно и силаж) Сладка царевица	П	Царевичен стъблопробивач (*Ostrinia nubilalis*), Видове нощенки (*Sesamia nonagrioides*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exiqua*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-87 (начало на изметляване:наличие на метлица на върха на стъблото-физиологична зрялост) Юни-септември	2	10 дни	40-60 мл продукт /дка	30-80 л/дка	2,0-3,0 г а.в./дка	7	Минималната препоръчителна доза е 2,0 г а.в./дка (40 мл продукт/дка).
11	Картофи, Сладки картофи	П	Картофен молец (*Phthorimaea operculella*)	Конвенционална наземна техника	Картофи BBCH 51-89 (поява на първите отделни бутони (1-2 мм) от първото съцветие-пълна зрялост) Сладки картофи BBCH 51-59 BBCH 69-89 Май-август	2	8 дни	50-70 мл продукт /дка	30-80 л/дка	2,5-3,5 г а.в./дка	14	Минималната препоръчителна доза е 2,5 г а.в./дка (50 мл продукт/дка). Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69).

12	Картофи, Сладки картофи	П	Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*)	Конвенционална наземна техника	Картофи BBCH 31-69 (начало на сгъстяване-край на цъфтежа на първото съцветие) Сладки картофи BBCH 31-59 Май-август	2	14 дни	20-24 мл продукт /дка	30-80 л/дка	1,0-1,2 г а.в./дка	14	Минималната препоръчителна доза е 1 г а.в./дка (20 мл продукт/дка). Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69).

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1448/04.06.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 Съдържа Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe2 SPe3