РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-3072/05.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД – 5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявление с вх. № 6962/29.03.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД и писмо с вх. № 20400/30.09.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 02092 – ПРЗ Издание: 1/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СЕРИФЕЛ,** съдържащ активното вещество *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI 600 - 11% w/w (5,5 x10^{10} cfu/г), с притежател на разрешението – БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, както следва:

1.1. На втора страница частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.2. На четвърта страница частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.1 и 1.2:

Със заявление с вх. № 6962/29.03.2024 г. от БАСФ СЕ се заявява изменение на **РАЗРЕШЕНИЕ № 02092 – ПРЗ Издание: 1/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на БАБХ по чл. 68, ал. 1 от ЗЗР, касаещо премахване на карантинния срок на разрешените употреби.

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 20400/30.09.2024 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям шест месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **СЕРИФЕЛ**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 02092 – ПРЗ Издание: 1/24.08.2023 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-3072/05.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **СЕРИФЕЛ**
Формулация: намокрим прах (ВП)
Концентрация на активното вещество: *Bacillus amiloliquefacien*s щам MBI 600 - 11% w/w (5,5 x10^{10} cfu/г)

№	Култура и/или описание (a)	ПО или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни мин/ макс	Грама продукт/дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество/дка	(l)	
1.	Лозя (десертни сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67-89 (70% опадане на ресите – плодът е готов за беритба)	10	7	50 г/дка	10-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
2.	Лозя (винени сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 67-90 (70% опадане на ресите – стареене)	10	7	50 г/дка	10-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	

3.	Ягоди	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89 (първи цветоноси на дъното на розетката – втора реколта)	6	5	50 г/дка	20 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
4.	Малини Къпини	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89	6	5	50 г/дка	30 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
5.	Домати Пипер Патладжан	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)	6	5	50 г/дка	30 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
6.	Домати Пипер Патладжан	П	Кафяви петна/алтернария (*Alternaria solani, Alternaria alternata*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)	6	5-10	25 г/дка	30–100 л/дка	2,75 г а. в./дка	-	
7.	Гъби	О/З	Триходерма (*Trichoderma aggressivum*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-49	1	-	2,5 г /дка/100 кг субстрат	275 мл/100 кг субстрат	0,25 г а. в./ 100 кг субстрат	-	
8.	Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)	6	5	50 г/дка	20 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата

Recoverable Signature

X РД11-3072/05.12.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **СЕРИФЕЛ**

Формулация: намокрим прах (ВП)

Концентрация на активното вещество: *Bacillus amiloliquefaciens* щам MBI 600 - 11% w/w (5,5 x10^{10} cfu/г)

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни мин/ макс	Грама продукт/ дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	Грама активно вещество/ дка		
1.	Бамя	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-89	6	5	50 г/дка	30 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
2.	Домати Пипер Патладжан	О	Кафяви петна/Алтернария (*Alternaria solani, Alternaria alternate*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)	6	5-10	25 г/дка	30-100 л/дка	2,75 г а.в./дка	-	

3.	Марули Рукола Дива рукола Спанак	П/О	Склеротийно/Бяло гниене (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor)* Ризоктония (*Thanatephorus cucumeris*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 01-18	5	5	50 г/дка	20-30 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	Baby leaf (реколтата до 6-8 същински листа)
4.	Киви	П	Сиво гниене (теломорф: *Botryotinia fuckeliana*) Бактериоза (*Pseudomonas syringae pv. actidiae*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 55-98	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
5.	Главесто зеле Брюкселско зеле Савойско зеле Червено (лилаво) зеле Сърцевидно зеле Карфиол	П	Стемфилиум (*Stemphilium sp.*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 55-98 (видими първите цветчета на централното стъбло – растенията са сухи)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
			Бактериоза (*Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.*) Кафяви петна/алтернария (*Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola*)		BBCH 13-89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване)							
6.	Броколи	П	Стемфилиум (*Stemphilium sp.*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 41-48 (начало на развитие на страничните пъпки - 80% от зелетата напълно затворени)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	

			Бактериоза (*Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.*) Кафяви петна/алтернария (*Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola*)		ВВСН 13-89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване)							
7.	Грах	П	Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) Аскохитоза (*Didymella pisi*) Антракноза (*Glomerella cingulata*)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-89 (3 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 3 мустачета - пълна зрялост)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а. в./дка	-	
8.	Фъстъци	П	Склеротиния (*Sclerotinia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-89 (разлистени 5 листа-пълна зрялост)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	
9.	Тикви Твърдокора, Едроплодна (бяла), Мускатна (цигулка), Свинска, Смокинова, кратуни	П/О	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*) Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*) Кафяви петна/алтернария (*Alternaria cucumerina*) Ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	

10.	Пъпеши	П	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*), Кафяви петна/ алтернария *Alternaria cucumerina*)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	
		П/О	Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*), Ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)									
11.	Диня	П	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*) Алтернария (*Alternaria cucumerina*)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	
12.	Диня	П/О	Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*), Ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	

13.	Краставици Тиквички	П/О	Брашнеста мана (*Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*) Черно стъблено гниене (фома) (*Stagonosporopsis cucurbitacearum*) Кафяви петна/алтернария (*Alternaria cucumerina*) Рризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми (3-5 лист на културата)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	
14.	Ягоди	П/О	Фитофторно гниене (*Phytophthora cactorum*) Увяхване на разсада (*Phytophthora* sp.) Ризоктония (*Rhizoctonia* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	До BBCH 69 (край на цъфтежа)	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	
			Брашнеста мана (*Podosphaera macularis*)		При първи симптоми							
15.	Растения от род коноп Cannabis (Канабис)	П/О	Сиво гниене (*Botryotinia fuckeliana*)	Конвен-ционална наземна техника	При първи симптоми	6	5	50 г/дка	20-100 л/дка	5,5 г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения