РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-3101/09.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и предложение с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № № 22030/1.10.2021 г. и 2189/30.01.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД, писмо с вх. № 23075/31.10.2024 г. от БАСФ ЕООД и писмо с вх. № 22635/25.10.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ФАВИА**

Активно вещество: пираклостробин (pyraclostrobin) – 200 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ СЕ/BASF SE, Германия

Производител на активното вещество пираклостробин: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на ВАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с локално системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 150 мл (75 г), 250 мл (125 г), 500 мл (250 г), 1 л (500 г) бутилка от HDPE;
- 150 мл (75 г), 250 мл (125 г), 500 мл (250 г), 1 л (500 г) бутилка от f-HDPE;
- 1 л (500 г) еко-бутилка от HDPE;
- 1 л (500 г) еко-бутилка от f-HDPE;
- 2,2 л (1 кг), 5 л (2.5 кг), 10 л (5 кг) контейнер от HDPE;
- 2,2 л (1 кг), 5 л (2.5 кг), 10 л (5 кг) контейнер от f-HDPE;
- 5 л (2,5 кг), 10 л (5 кг) еко-контейнер от HDPE;
- 5 л (2,5 кг), 10 л (5 кг) еко-контейнер от f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – защитни ръкавици и гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.3 Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – защитни ръкавици при повторно влизане в третираните площи.
1.4 Да се осигури 5 метра буферна зона до повърхностни води или дюзи намаляващи разпръскването с 50% при при листни и луковични зеленчуци, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество пираклостробин, съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 15.09.2026 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ФАВИА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ФАВИА** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-3101/09.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ФАВИА**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активните вещества: пираклостробин (pyraclostrobin) – 200 г/кг

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Мл продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1.	Картофи (SOLTU)	П	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Алтернария (*Alternaria solani*) (ALTESO)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-97 (образуване на основни странични разклонения под и над почвената повърхност (главно стъбло)- листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и изсъхват)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	10-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	

2.	Домати (LYPES)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Алтернария (*Alternaria solani*) (ALTESO) Брашнеста мана (*Leveillula taurica* (LEVETA) *Oidium neolycopersici* (OIDINL))	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на основнаото стъбло-пълна зрялост)	3	7-10-	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	
3.	Домати (LYPES), Пипер (CPSAN)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Брашнеста мана (*Leveillula taurica* (LEVETA*)* *Oidium neolycopersici* (OIDINL)) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESO)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на основнаото стъбло-пълна зрялост)	3	7-10-	50 мл продукт/ дка	20-120 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	20 мл/1000 $м^2$ ПВЛМ

4.	Марули (LACSA), Спанак (SPQOL) и листни растения Салати като агнешка маруля (VLLLO) Италианска царевична салата (VLLER) Ендивия (Градинска жлъчка) (CICEN, CICEL) Рукола (ERUVE)Листа от манголид и цвекло (BEAVV)	П	Мана (*Bremia lactucae*) (BREMLA) Мана (*Peronospora* sp.) (PEROSP)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-49 (разтворен пети същински лист-формирана цялата листна маса)	2	7-10	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	14	
5.	Тиквови (ядлива кора): краставици (CUMSA), тиквички (CUUPG)	О П	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	40-120 л/дка 40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	1	20 мл/1000 $м^2$ ПВЛМ

6.	Тиквови с (неядлива кора): пъпеши (CUMME), дини (CITLA)	О П	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	40-120 л/дка 40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	20 мл/1000 $м^2$ ПВЛМ
7.	Лук (ALLCE), Чесън (ALLSA) Шалот (ALLAS)	П	Мана (*Peronospora destructor*) (PERODE)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-49 (трети лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Растежът е завършеил:дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта.)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
8.	Главесто цветно зеле (BRSOL) Карфиол (BRSOB Броколи (BRSOK)	П	Мана (*Peronospora parasitica*) (PEROPA)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-49 (формиране на страничните разклонения-достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена))	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
9.	Главесто зеле (BRSOL)	П	Мана (*Peronospora parasitica*) (PEROPA) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-49 (формиране на страничните разклонения-достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена))	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	

Метод ПВЛМ (площ вертикална листна маса) се прилага само при линейни системи за засаждане. За да се изчисли необходимото количество продукт за растителна защита се отчита височината на третираната част на растенията и междуредовото разстояние.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-3101/09.12.2024 г.

Приложение № 2
за разрешените минимални употреби
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож ен. дни (мин)	Мл продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1.	Патладжан (SOLME)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Алтернария (*Alternaria solani*) (ALTESO) Брашнеста мана (*Leveillula taurica* (LEVETA) *Oidium neolycopersici* (OIDINL))	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на основнаото стъбло-пълна зрялост)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	

2.	Патладжан (SOLME)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Брашнеста мана (*Leveillula taurica* (LEVETA*)* *Oidium neolycopersici* (OIDINL)) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESO)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 11-89 (първи същински лист на основнаото стъбло-пълна зрялост)	3	7-10-	50 мл продукт/ дка	20-120 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	
3.	Кресон (LEPSA) Крес (BARVE)	П	Мана (*Bremia lactucae*) (BREMLA) Мана (*Peronospora* sp.) (PEROSP)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-49 (разтворен пети същински лист-формирана цялата листна маса)	2	7-10	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	14	
4.	Артишок (CYUSC)	П	Брашнеста мана (*Leveillula* sp. (LEVESP) *(Golvinomyces cichoracearum*) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-85	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
5.	Главесто цветно зеле (BRSOL) Карфиол (BRSOB) Броколи (BRSOK)	П	Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP) *Mycosphaerella brassicicola* (MYCOBR)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 20-49 (формиране на страничните разклонения-достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена))	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	

6.	Праз (ALLPO)	П	Мана (*Phytophthora porri*) (PHYTPO)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15-49 (трети лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Растежът е завършеил:дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта.)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
7.	Пресни билки, подправки: босилек, (OCIBA) магданоз, (PARCR) мащерка, (THYVU) розмарин (RMSOF)	П	Мана (*Peronospora* spp. (PEROSP) *P. belbahrii* и други) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP) Мана (*Bremia* spp.) (BREMLA)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-49	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-3101/09.12.2024 г.

Приложение № 3 към заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра инхалационна токсичносг, категория 4 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3 Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H332 H335 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H332 H335 H410	EUH401	SP1 SPe 3