РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-3126/11.12.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 и предложение с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № № 7229/8.04.2022 г. и 20973/27.10.2023 г. от Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия, с упълномощен представител АДАМА България ЕООД, писмо с вх. № 7229/08.04.2022 г. от АДАМА България ЕООД и писмо с вх. № 23672/08.11.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ФОРАПРО**

Активно вещество: протиоконазол (prothioconazole) – 175 г/л

фенпропидин (fenpropidin) – 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: АДАМА Мактешим Лтд/ADAMA Makhteshim Ltd, Израел

Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия

Производител на активното вещество фенпропидин: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (EC)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 500 мл и 1 л бутилка от COEX HDPE/PA
- 5 л, 10 л, 15 л и 20 л бутилка или контейнер от COEX HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се носи подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.3 Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
1.4 Да се осигурят дюзи, намаляващи отвяването с 50% или 10 м буферна зона до постоянно пребиваващи и случайно намиращи се наблизо лица.
1.5 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра с включени дюзи, намаляващи разпръскването със 75% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при пролетни зърнено-житни култури.
1.6 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра с включени дюзи, намаляващи разпръскването с 90% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при зимни зърнено-житни култури.
1.7 Опасен за пчели. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която

изтича одобрението на активното вещество протиоконазол, съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 , а именно до 18.08.2026 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Адама Агрикалчър БВ/Adama Agriculture BV, Нидерландия.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ФОРАПРО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ФОРАПРО** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-3126/11.12.2024

Приложение № 1 за разрешените
употреби към заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ФОРАПРО**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕС)

Концентрация на активните вещества: протиоконазол* – 175 г/л; фенпропидин** – 250 г/л

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода литра/ дка Мин// макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1.	Зимна пшеница (мека и твърда) (TRZAW, TRZDW), пролетна пшеница (мека и твърда) (TRZAS, TRZDS)	П	Ранен листен пригор (*Septoria tritici*), брашнеста мана (*Erysiphe graminis)*, жълта ръжда (*Puccinia striiformis*), кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-65 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	80-100 мл/дка	10-40 л/дка	14*+20** – 17,5*+25** г а.в./дка	-	

2.	Зимен ечемик (HORVW), пролетен ечемик (HORVS)	П	Брашнеста мана *(Erysiphe graminis)*, листен пригор *(Rhynchosporium secalis)*, мрежести петна (*Pyrenophora teres)*, кафява листна ръжда (*Puccinia hordei*)	Механи-зирана наземна техника	BBCH 30-65 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	80-100 мл/дка	10-40 л/дка	14*+20** – 17,5*+25** г а.в./дка	-	
3.	Ръж (SECCW)		Брашнеста мана (*Erysiphe graminis)*, листен пригор (*Rhynchosporium secalis)*, кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*)	Механи-зирана наземна техника	BBCH 30-65 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	80-100 мл/дка	10-40 л/дка	14*+20** – 17,5*+25** г а.в./дка	-	
4.	Тритикале (TTLSS)		Брашнеста мана *(Erysiphe graminis)*, ранен листен пригор (*Septoria tritici*), кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*), жълта ръжда (*Puccinia striiformis*)	Механи-зирана наземна техника	BBCH 30-65 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	80-100 мл/дка	10-40 л/дка	14*+20** – 17,5*+25** г а.в./дка	-	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне

(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-3126/11.12.2024

Приложение № 2 към заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Кожна сенсебилизация, категория 1B Сериозно увреждане на очите, категория 1 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3 Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H315 H317 H318 H335 H373 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H315 H317 H318 H335 H373 H410	EUH401	SP1 SPe3 SPe8