**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

Recoverable Signature

X РД11-1125/11.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

# З А П О В Е Д

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД–1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11090/09.06.2023 г. от Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения, с упълномощен представител - Химконсулт ЕООД, писмо с вх. № 4423/21.02.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и писмо с вх. № 6626/19.03.2025 г от Химконсулт ЕООД,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ОКСИТЕК 25% ХАЙ БИО**

Активно вещество: меден оксихлорид (copper oxychloride) – 250 г/кг (кандидат за замяна)

Производител на продукта за растителна защита:
- Албо Мексико С. де Р.Л./Albaugh Mexico S. de R.L. de C.V., Мексико
- Албо Бразилия/Albaugh Brasil, Бразилия
- Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения

Производител на активното вещество меден оксихлорид: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид/бактерицид с несистемно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 1 кг торба от многослойна хартия (PET/AL/LDPE);
- 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг торба от многослойна хартия (paper/PE/paper/HDPE);
- 6 кг, 7,5 кг, 9,6 кг торба от (PET/PE)

**Специфични изисквания за употреба:**

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища
1.2. Да се носят работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.3. Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
1.4. Да се осигури нетретирата буферна зона от 10 метра до повърхностни води при лозя, патладжани, домати, пипер, пъпеши, дини, краставици, корнишони, тиквички, картофи, чесън, лук, шалот, къдрава ендивия и маруля, с цел опазване на водните организми.
1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностни води при мушмули, маслини, цитрусови култури, семкови, костилкови и цитрусови овощни култури, с цел опазване на водните организми.
1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи при семкови и костилкови овощни видове (ранно приложение) и лозя, с цел опазване на нецелевите членестоноги.
1.7. Да не се прилага при семкови/костилкови и черупкови овощни култури от началото на падането на листата докато издънките не достигнат до 30 % от крайната дължина.
1.8. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използването на ОКСИТЕК 25% ХАЙ БИО. Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.
1.9. Да не се прилага този продукт и други продукти съдържащи мед (Cu) в доза по-висока от 4 кг Cu/ha годишно, с цел опазване на нецелевите членестоноги.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която

ятича одобрението на активното вещество меден оксихлорид, съгласно чл. 32, т.1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2026 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОКСИТЕК 25% ХАЙ БИО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ОКСИТЕК 25% ХАЙ БИО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1125/11.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ОКСИТЕК 25% ХАЙ БИО**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно вещество: меден оксихлорид (copper oxychloride) – 250 г/кг

| № | Култура и/или описание (a) | П/О или З (b) | Вредител или група вредители, с които се води борба (c) | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) (l) | Забележки (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интервал между прилож. дни (мин) | Грама продукт/ дка Мин/макс | Вода л/дка Мин/ макс | Грама активно вещество/ дка | | |
| 1. | Къдрава ендивия (ескарол) (CICEN), маруля (LACSA) | П | Мана *(Bremia lactucae)* | Конвенционална наземна техника | Третирането да се извърши превантивно, при условия благоприятни за развитие на болестта<br><br>BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - формирана цялата листна маса) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 100 л/дка | 75 г а.в./дка | 7 | 300 г продукт /100 л вода |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Чесън (ALLSA), лук (ALLCE), шалот (ALLAS) | П | Мана *(Peronospora destructor)* | Конвен-ционална наземна техника | Третирането да се извърши превантивно, при условия, благоприятни за развитие на болестта<br><br>BBCH 14-47 (четвърти лист ясно видим – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са завити) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 40-80 л/дка | 75 г а.в./дка | 3 | |
| 3. | Картофи (SOLTU) | П | Мана *(Phytophthora infestans)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-85<br><br>(разтваряне на петите листа на главното стъбло (> 4 см)) - плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 80-100 л/дка | 75 г а.в./дка | 7 | |
| 4. | Патладжан (SOLME) | П/ О | Мана *(Phytophthora nicotianae* var. *nicotianae)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-89<br><br>(5-ти същински лист по главното стъбло - пълна зрялост) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | 3 | |
| 5. | Домати (LYPES) | П/ О | Картофена мана по доматите *(Phytophthora infestans)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-89<br><br>(5-ти същински лист по главното стъбло - пълна зрялост) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | За прера-ботка – 10 дни, за консума-ция – 3 дни | Максимум 5 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Пъпеш (CUMME), диня (CITLA), тиква (CUUPE) | П | Мана *(Pseudoperonospora cubensis)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 10-89<br><br>(котиледоните се разгъват напълно - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) | 5 | 7-10 | 200 г/дка | 60-100 л/дка | 50 г а.в./дка | 7 | |
| 7. | Краставици, корнишони (CUMSA), тиквички (CUUPG) | П/О | Мана *(Pseudoperonospora cubensis)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 10-89<br><br>(котиледоните се разгъват напълно - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) | 5 | 7-10 | 200 г/дка | 60-100 л/дка | 50 г а.в./дка | 3 | |
| 8. | Сливи (PRNDO) | П | Мехурки по сливата *(Taphrina pruni)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-53<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) | 2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Череши (PRNAV), вишни (PRNCE) | П | Къдравост *(Taphrina wiesneri)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-53<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори | 2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 5 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 2 |
| 10. | Праскови (вкл. нектарини) (PRNPS) | П | Къдравост по прасковата *(Taphrina deformans)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-53<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) | 2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 5 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 2 |
| 11. | Ябълки (MABSD) | П | Нектриален рак *(Nectria galligena)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-99<br><br>(нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени - продукцията е прибрана) | 3 | 7-14 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Струпясване *(Venturia inaequalis)* | | BBCH 91-53<br><br>(нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени - разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете) | 2 | 14-21 | | | | | |
| 12. | Круши (PYUCO) | П | Нектриален рак *(Nectria galligena)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-99<br><br>(нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени - продукцията е прибрана) | 3 | 7-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 4 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 2 |
| | | | Струпясване *(Venturia pyrina)* | | BBCH 91-53<br><br>(нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени - разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете) | 2 | 14-21 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Японска мушмула (EIOJA) | П | Струпясване *(Venturia inaequalis)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-53 | 2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | |
| 14. | Бадем (PRNDU) | П | Къдравост по прасковата *(Taphrina deformans)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-53 | 2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 4 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 2 |
| 15. | Маслини (OLVEU) | П | Церкоспороза *(Pseudocercospora cladosporioides)*, антракноза *(Glomerella cingulata; Colletotrichum acutatum)*, листни петна (*Fusicladium oleagineum)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 10-85 | 2 | 21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | 14 | |
| 16. | Лозя (VITVI) | П | Мана *(Plasmopara viticola)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 17-81 (7 и повече листа са отворени - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености) | 5 | 7-10 | 240-300 г/дка | 50-100 л/дка | 60-75 г а.в./дка | 21 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Портокали (CIDSI), мандарина (включва клементина и хибриди) (CIDRE), горчив портокал (CIDAU), лайм (CIDAF), лимон (CIDLI), грейпфрут (CIDPA | П | Мана *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora hibernalis, Phytophthora citricola, Phytophthora syringae, Phytophthora nicotianae var. parasitica),* бактериоза *(Pseudomonas syringae* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-89 | 3 | 7-14 | 300-400 г/дка | 100-200 л/дка | 75-100 г а.в./дка | 14 | Максимум 3 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 2 |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1125/11.04.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед №

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ОКСИТЕК 25% ХАЙ БИО**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активно вещество: меден оксихлорид (copper oxychloride) – 250 г/кг

| № | Култура и/или описание (a) | П/О или З (b) | Вредител или група вредители, с които се води борба (c) | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) (l) | Забележки (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интервал между прилож. дни (мин) | Грама продукт/ дка Мин/макс | Вода л/дка Мин/ макс | Грама активно вещество/ дка | | |
| 1. | Къдрава ендивия (ескарол) (CICEN), маруля (LACSA) | О | Мана *(Bremia lactucae)* | Конвенционална наземна техника | Третирането да се извърши превантивно, при условия благоприятни за развитие на болестта<br><br>BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - формирана цялата листна маса) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 100 л/дка | 75 г а.в./дка | 7 | 300 г продукт /100 л вода |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Пипер (CPSAN | П/О | Кафяви листни петна (алтернариоза) *(Alternaria solani)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-89<br><br>(5-ти същински лист по главното стъбло - пълна зрялост) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | 3 | |
| 3. | Домати (LYPES) | П/О | Кафяви листни петна (алтернариоза) *(Alternaria solani)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-89<br><br>(5-ти същински лист по главното стъбло - пълна зрялост) | 5 | 7-10 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | За преработка – 10 дни, за консумация – 3 дни | Максимум 5 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 1 |
| 4. | Череши (PRNAV), вишни (PRNCE) | П | Бактериоза *(Pseudomonas syringae)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-99<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - продукцията е прибрана) | 3 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 5 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 1 |
| | | | Бяла ръжда *(Blumeriella jaapi),* сачмянка *(Wilsonomyces carpophilus),* ранно и късно кафяво гниене *(Monillia fructigena; Monillia laxa)* | | BBCH 91-53<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Кайсии (PRNAR) | П | Бактериоза *(Pseudomonas syringae)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-99<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - продукцията е прибрана) | 3 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | |
| | | | Сачмянка *(Wilsonomyces carpophilus),* ранно и късно кафяво гниене *(Monillia fructigena; Monillia laxa)* | | BBCH 91-53<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) | 2 | | | | | | |
| 6. | Нектарини | П | Бактериоза *(Pseudomonas syringae)* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 91-99<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - продукцията е прибрана) | 3 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 5 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 1 |
| | | | Сачмянка *(Wilsonomyces carpophilus),* ранно и късно кафяво гниене *(Monillia fructigena; Monillia laxa)* | | BBCH 91-53<br><br>(растежът на леторастите е приключен; листата са наситено зелени - отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Круши (PYUCO) | П | Ранно и късно кафяво гниене *(Monillia fructigena; Monillia laxa),*<br><br>Септориоза *(Septoria pyricola)* | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 91-53<br><br>(нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени - разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете) | 2<br><br>1 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 4 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 1 |
| 8. | Мушмула | П | Струпясване *(Venturia inaequalis)* | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 91-53 | 2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | |
| 9. | Бадем (PRNDU) | П | Бактериоза *(Pseudomonas syringae)*<br><br>Сачмянка *(Wilsonomyces carpophilus),*<br><br>ранно и късно кафяво гниене *(Monillia fructigena; Monillia laxa)* | Конвен-ционална наземна техника | ВВСН 91-99<br><br>ВВСН 91-53 | 3<br><br>2 | 14-21 | 300 г/дка | 60-100 л/дка | 75 г а.в./дка | _ | Максимум 4 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Портокали (CIDSI), мандарина (включва клементина и хибриди) (CIDRE), горчив портокал (CIDAU), лайм (CIDAF), лимон (CIDLI), грейпфрут (CIDPA | П | Алтернариоза *(Alternaria citri),* | Конвен-ционална наземна техника | BBCH 15-89 | 3 | 7-14 | 300-400 г/дка | 100-200 л/дка | 75-100 г а.в./дка | 14 | Максимум 3 приложения годишно на този продукт за всички употреби, вкл. тези в Приложение № 1 |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1125/11.04.2025 г.

Приложение № 3
към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*

| **Класификация** | | **Етикетиране** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Клас и категория на опасност** | **Код (ове) на предупрежде-нието (ята) на опасност** | **Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)** | **Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност** | **Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност** | **Специфич-ни предпазни мерки за безопасност** |
| Остра токсичност (орална), категория 4<br><br>Дразнене на очите, категория 2<br><br>Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1<br><br>Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1 | H302<br>H319<br>H400<br>H410 | GHS07<br>GHS09<br>Внимание | H302<br>H319<br>H410 | EUH401 | SP фрази:<br>SP1<br>SPe1<br>SPe3<br>SPe8 |