РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-1131/11.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 67, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. №№ 22030/1.10.2021 г. и № 2189/30.01.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД и писмо с вх. № 22635/23.10.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 02151 – ПРЗ Издание: 1/02.01.2025 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ФАВИА**, с притежател на разрешението – **БАСФ СЕ/BASF SE, Германия**, както следва:

1.1. На първа страница в частта „**Производител:“** текста „**Глобахем Н.В./Globachem N.V., Belgium**“ се заменя с „**БАСФ СЕ/BASF SE, Германия**“.

1.2. На първа страница в частта „**Функция на продукта**:“ текста „**фунгицид с локално и системно действие**“ се заменя с „**фунгицид с локално системно действие**“.

1.3. На трета страница частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.4. На осма страница частта „**РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3 и т. 1.4:

Заявления с вх. №№ 22030/1.10.2021 г. и № 2189/30.01.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

Писмо с вх. № 22635/23.10.2024 г. от ЦОРХВ.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям три месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ФАВИА**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 02151 – ПРЗ Издание: 1/02.01.2025 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1131/11.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ФАВИА**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активното вещество: пираклостробин (pyraclostrobin) – 200 г/кг

	Култура и/или описание	ПО/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин// макс	Грама а.в./дка	(l)	(m)
1.	Картофи (SOLTU)	П	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Алтернария (*Alternaria solani*) (ALTESO)	Конвенционална наземна техника	BBCH 20-97 (образуване на основни странични разклонения под и над почвената повърхност (главно стъбло)-листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и изсъхват)	3	7-10	50 мл/дка	10-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	

2.	Домати (LYPES)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Алтернария (*Alternaria solani*) (ALTESO) Брашнеста мана (*Leveillula taurica* (LEVETA), *Oidium neolycopersici* (OIDINL))	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 11-89 (първи същински лист на основното стъбло-пълна зрялост)	3	7-10-	50 мл/дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	
3.	Домати (LYPES) Пипер (CPSAN)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Брашнеста мана (*Leveillula taurica* (LEVETA) *Oidium neolycopersici* (OIDINL)) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESO)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 11-89 (първи същински лист на основнаото стъбло-пълна зрялост)	3	7-10-	50 мл/дка	20-120 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	20 мл/1000 $м^2$ ПВЛМ

4.	Марули (LACSA) Спанак (SPQOL) и листни растения Салати като агнешка маруля (VLLLO) Италианска царевична салата (VLLER) Ендивия (Градинска жлъчка) (CICEN, CICEL) Рукола (ERUVE) Листа от манголд и цвекло (BEAVV)	П	Мана (*Bremia lactucae*) (BREMLA) Мана (*Peronospora* sp.) (PEROSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15-49 (разтворен пети същински лист-формирана цялата листна маса)	2	7-10	50 мл/дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	14	
5.	Тиквови с ядлива кора: краставици (CUMSA), тиквички (CUUPG)	О	Кубинска мана (*Pseudoperono spora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7-10	50 мл/дка	40-120 л/дка	0,01 г а.в./дка	1	20 мл/1000 $м^2$ ПВЛМ
		П							40-100 л/дка			

6.	Тиквови с неядлива кора: пъпеши (CUMME); дини (CITLA)	О	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7-10	50 мл/ дка	40-120 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	20 мл/1000 $м^2$ ПВЛМ
		П							40-100 л/дка			
7.	Лук (ALLCE) Чесън (ALLSA) Шалот (ALLAS)	П	Мана (*Peronospora destructor*) (PERODE)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-49 (трети лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Растежът е завършил:дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта.)	3	7-10	50 мл/дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
8.	Главесто зеле (BRSOL) Карфиол (BRSOB), Броколи (BRSOK),	П	Мана (*Peronospora parasitica*) (PEROPA)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-49 (формиране на страничните разклонения-достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена))	3	7-10	50 мл/дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
9.	Артишок (CYUSC)	П	Мана (*Bremia* spp.) (BREMLA)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-85	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	

Метод ПВЛМ (площ вертикална листна маса) се прилага само при линейни системи за засаждане. За да се изчисли необходимото количество продукт за растителна защита се отчита височината на третираната част на растенията и междуредовото разстояние.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1131/11.04.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ФАВИА**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активното вещество: пираклостробин (pyraclostrobin) – 200 г/кг

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин// макс	Грама а.в./дка	(l)	(m)
1.	Патладжан (SOLME)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Алтернария (*Alternaria solani*) (ALTESO) Брашнеста мана (*Leveilluta taurica)* (LEVETA) *Oidium neolycopersici* (OIDINL))	Конвенционална наземна техника	BBCH 11-89 (първи същински лист на основното стъбло-пълна зрялост)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	

2.	Патладжан (SOLME)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN) Брашнеста мана (*Leveilluta taurica)* (LEVETA) *Oidium neolycopersici* (OIDINL)) Алтернария (*Alternaria spp.*) (ALTESO)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 11-89 (първи същински лист на основното стъбло-пълна зрялост)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-120 л/дка	0,01 г а.в./дка	3	
3.	Кресон (LEPSA) Крес (BARVE)	П	Мана (Bremia lactucae) (BREMLA) Мана (Peronospora sp.) (PEROSP)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-49 (разтворен пети същински лист-формирана цялата листна маса)	2	7-10	50 мл продукт/ дка	40-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	14	
4.	Артишок (CYUSC)	П	Брашнеста мана (*Leveillula sp. (*LEVESP*) (Golvinomyces cichoracearum)* Алтернария *(Alternaria spp.) (*ALTESP*)*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 13-85	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
5.	Главесто зеле (BRSOL) Карфиол (BRSOB), Броколи (BRSOK)	П	Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP) *Mycosphaerella brassicicola* (MYCOBR)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 20-49 (формиране на страничните разклонения-достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	

6.	Праз (ALLPO)	П	Мана (*Phytophthora porri*) (PHYTPO)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 15-49 (трети лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Растежът е завършил: дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта)	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	
7.	Пресни билки, подправки: босилек, (OCIBA), магданоз, (PARCR), мащерка, (THYVU), розмарин (RMSOF)	П	Мана (*Peronospora* spp. (PEROSP), *P. belbahrii* и други) Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP) Мана (*Bremia* spp.) (BREMLA)	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 20-49	3	7-10	50 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	0,01 г а.в./дка	7	

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ФАВИА за разрешените минимални употреби в Приложение № 2 към настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при минималните употреби в Приложение № 2 към настоящата заповед е на лицето прилагащо продукта.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения