РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-1139/11.04.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 и Предложение с вх. № ВД – 1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Зявления с вх. № 15033/14.09.2020 г. от БАСФ Агро Б.В., Арнхем, клон Фрайенбах/BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Швейцария и вх. № 26068/09.12.2024 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител съответно БАСФ ЕООД, писмо с вх. № 6279/14.03.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и писмо с вх. № 19713/20.10.2022 г. от БАСФ ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЕНЕРВИН ПРО**

Активни вещества:
- аметоктрадин (ametoctradin) – 75 г/л
- калиеви фосфонати (potassium phosphonates) – 453 г/л

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Агро Б.В./BASF Agro B.V., Швейцария

Производител на активното вещество аметоктрадин: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия

Производител на активното вещество калиеви фосфонати: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с комбинирано (системно и несистемно) действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 0,15 л, 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 1 л еко, 5 л, 5 л еко, 10 л, 10 л еко, 15 л еко, 20 л, 50 л бутилка/туба от HDPE
- 0,15 л, 0,25 л, 0,5 мл, 1 л, 1 л еко, 5 л, 5 л еко, 10 л, 10 л еко, 15 л еко, 20 л, 50 л бутилка/туба от f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се използват работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.3 Да се използват работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака), лични предпазни средства - защитни ръкавици и гащеризон при интензивен контакт с третираните култури.

1.4 Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.5 Да се използват работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици при повторно влизане в третираните площи с лозя.

1.6 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до живущи и случайно намиращи се наблизо лица.

1.7 Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми при лозя.

1.8 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми при тиквови с ядлива и неядлива кора, домати, патладжан, марули и салати, картофи, праз, билки и пролетен лук.

1.9 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми при оранжерийните култури.

1.10 Да не се напоява един ден след приложение при маруля и салати с цел опазване на птиците.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество аметоктрадин съгласно чл. 32, пар. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009, а именно до 31.12.2025 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ЕНЕРВИН ПРО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ЕНЕРВИН ПРО** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1139/11.04.2025

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕНЕРВИН ПРО**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: аметоктрадин - 75 г/л, калиеви фосфонати - 453 г/л

	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Лоза (винени и десертни сортове) (VITVI)	П	Мана (*Plasmopara viticola*) (PLASVI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 55-83 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-зърната формират цвят)	2	10-14	420 мл/дка Доза в LWA (листна повърхност): 3,2 L/10000 м^2 LWA (макс. доза на хектар се достига при 13125 м^2 листна повърхност /ха)	10-120 л/дка	0,0315*+ 0,190** г а.в./дка	35	

2	Пъпеши (CUMME))	П	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 29-89 (поява на 9 или повече странични разклонения-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в./	1	
3	Домати (LYPES)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-89 (видима поява на първо връхно разклонение-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	
4	Картофи (SOLTU)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-89 (поява на първото основно странично разклонение-плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват)	2	5-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	
5	Сем. Тиквови с ядлива кора (краставици (CUMSA), тиквички (CUUPG))	О	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 29-89 (поява на 9 или повече странични разклонения-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-150 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	LWA доза: 1,28 L/10000 m^2 LWA
6	Домати (LYPES)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-89 (видима поява на първо връхно разклонение-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-150 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	LWA доза: 1,28 L/10000 m^2 LWA

7	Марули (LACSA) и салати (ендивия (CICEN)/ салата ескариол (CICEL)), спанак (SPQOL), листа от манголд (BEAVY), полска салата (VLLLO), италианска салата (VLLER), рукола (ERUVE), бяла рукола (DIPER), кресон (LEPSA), земен кресон (BARVE))	П	Мана (*Bremia lactuca* (BREMLA), *Peronospora* sp. (PEROSP))	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 41-49 (образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета-формирана цялата листна маса)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	

Обозначение: аметоктрадин*, калиеви фосфонати**

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1139/11.04.2025

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕНЕРВИН ПРО**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активните вещества: аметоктрадин - 75 г/л, калиеви фосфонати - 453 г/л

	Култура и/или описание	П О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож ен. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка	(l)	(m)
1	Праз (ALLPO)	П	Мана (*Phytophthora porri*) (PHYTPO)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-49 (5 лист по-голям от 3 см – достигнати типичните за сорта максимални височина и диаметър на стъблото)	1	-	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	

2	Пролетен лук (лук за зелено) (ALLCE)	П	Мана	Конвен-ционалана наземна техника	BBCH 15-49 (5 лист по-голям от 3 см – достигнати типичните за сорта максимални височина и диаметър на стъблото)	1	-	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	
3	Тикви (CUUMA), дини (CITLA)	П	Кубинска мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 29-89 (поява на 9 или повече странични разклонения-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в./	1	
4	Патладжан (SOLME)	П/О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-89 (видима поява на първо връхно разклонение-пълна зрялост)	2	7-10	320 мл/дка	10-150 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	1	LWA доза: 1,28 L/10000 m^2 LWA – при оранжерийно производство
5	Билки	П	Мана	Конвен-ционалана наземна техника	BBCH 41-49	2	7-10	320 мл продукт/ дка	10-100 л/дка	0,024*+ 0,145** г а.в	7	

Обозначение: аметоктрадин*, калиеви фосфонати**

Забележки:

- Българската агенция по безопасност на храните не носи отгооворност за евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
- Всяка отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето прилагащо продукта.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1139/11.04.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUH401 EUH208 - Съдържа 2-метилизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция	SP1 SPe1 SPe3