РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

20.6.2025 г.

X РД11-1848/20.06.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3133/18.06.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 28600/29.12.2021 г. и вх. № 7496/05.04.2024 г. от *ФМС Агро България ЕООД*, писма с вх. № 11652/13.06.2022 г. и вх. № 12039/30.05.2025 г. от *ФМС Агро България ЕООД* и писмо с вх. № 10117/05.05.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЕКСИРЕЛ®**

Активно вещество: циантранилипрол/ cyantraniliprole – 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ/ FMC International Switzerland Sarl
Производител на активното вещество циантранилипрол: ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ/ FMC International Switzerland Sarl
Функция на продукта за растителна защита: инсектицид със системно действие
Вид на формулацията: суспо-емулсия (CE)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 300 мл, 1 л, 3 л и 5 л бутилка от COEX HDPE/EVOH

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да се прилага веднъж на три години с цел опазване на подпочвените води.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица при приложения при цитруси и маслини до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури:

нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% или 20 метра с включени дюзи намаляващи отвяването със 75% или 30 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при употреба при цитруси (BBCH 31-50),

нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% или 30 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при употреба при цитруси (BBCH 09-89),

нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% или 20 метра с включени дюзи намаляващи отвяването със 75% при приложение при маслини,

нетретирана буферна зона от 15 метра или 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% или 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването със 75% или дюзи намаляващи отвяването с 90% при приложение лозя,

до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.7. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество циантранилипрол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **14.09.2027 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕКСИРЕЛ®** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЕКСИРЕЛ®** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *ФМС Агро България ЕООД*.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

20.6.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

20.6.2025 г.

X РД11-1848/20.06.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ЕКСИРЕЛ®**
Формулация: суспо-емулсия (CE)
Концентрация на активно/и вещество/а: циантранилипрол/ cyantraniliprole – 100 г/л

№	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1.	Лозя (винени сортове) (VITVI)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*) (POLYBO)	Механизирана наземна техника	BBCH 71-85 (завърз: младите плодове започват да наедряват,остатъците от цветовете опадат - омекване на зърната)	1 Прилага се веднъж на три години	-	34 мл/дка	57-68 л/дка	3,4 г а.в./ дка	10	Да не се прилага при наличие на цъфтящи плевели.

2.	Цитрусови култури	П	Цитрусов молец (*Prays citri*) (PRAYCI)	Механизирана наземна техника	ВВСН 31-50 (начало на растеж на леторастите - начало на цъфтеж)	1 Прилага се веднъж на три години	-	25-50 мл/дка	30-200 л/дка	2,5-5,0 г а.в./ дка	7	Да не се прилага при наличие на цъфтящи плевели.
			Цитрусов миниращ молец (*Phyllocnistis citrella*) (PHYNCI)					40-74 мл/дка	30-185 л/дка	4,0-7,4 г а.в./ дка		
			Зелена цитрусова листна въшка (*Aphis spiraecola*) (APHISI), Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*) (APHIGO)		ВВСН (09-89) ВВСН 09-39 (поява на зелено връхче - летрастите са достигнали 90% от крайната си дължина)			74 мл/дка	74-99 л/дка	7,4 г а.в./дка		
			Трипсове (*Pezothrips kellianus*) (PEZTKE)		ВВСН 51-71 (набъбване на цветните пъпки - формиране на плод)							
3.	Маслини	П	Маслинов молец (*Prays oleae*) (PRAYOL)	Механизирана наземна техника	ВВСН 50-81	2 Прилага се веднъж на три години	7	20-35 мл/дка	70-175 л/дка	2,0-3,5 г а.в./дка	14	Да не се прилага при наличие на цъфтящи плевели. Максимално количество от 7,4 г а.в./дка

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

20.6.2025 г.

X РД11-1848/20.06.2025

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Лозя (винени сортове) (VITVI)	П	Еднопоясен гроздов молец *(Eupoecilia ambiguella)* (CLYSAM)	Механизирана наземна техника	BBCH 71-85 (завърз: младите плодове започват да наедряват,остатъците от цветовете опадат - омекване на зърната)	1 Прилага се веднъж на три години	-	34 мл/дка	57-68 л/дка	3,4 г а.в./дка	10	Да не се прилага при наличие на цъфтящи плевели.

2.	Цитрусови култури	П	Средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*) (CERTCA)	Механизирана наземна техника	BBCH 81-89 (начало на оцветяването на плода-консумативна зрялост)	1 Прилага се веднъж на три години	-	74 мл/дка	74-99 л/дка	7,4 г а.в./дка	7	Да не се прилага при наличие на цъфтящи плевели.

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **ЕКСИРЕЛ®** за разрешените минимални употреби.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **ЕКСИРЕЛ®** за разрешените минимални употреби, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1848/20.06.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Кожна сенсибилизация, категория 1 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H315 H317 H411	EUH401	SP1 SPe2 SPe3 SPe8