РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

19.5.2025 г.

X РД11-1453/19.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 62, ал. 7 от Закона за защита на растенията и чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), Докладна записка с вх. № ВД-2578/19.05.2025 г. от директора на дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ и одобрена Докладна записка с вх. № ВД-2585/19.05.2025 г. на ресорния заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България продукта за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: МАВРИК 2 Ф / ЕВУР 2 Ф

Активно вещество: тау-флувалинат 240 г/л

Производител на продукта за растителна защита: АДАМА Мактешим Лтд., Израел

Производител на активното вещество тау-флувалинат: АДАМА Мактешим Лтд., Израел

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсия, масло във вода (ЕВ)

Категория на употреба: втора професионална

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици и гащеризон по време на прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да не се прилага през есента между стадии BBCH 10 и BBCH 29 върху изкуствено дренирани почви със съдържание на глина по-големи от 45 % с цел опазване на водните организми при зимна маслодайна рапица.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми при пролетна пшеница и пролетна маслодайна рапица.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при зимна пшеница, зимна маслодайна рапица, захарно цвекло и краставици.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване членестоногите/насекомите, които не са обект на третиране при маслодайна рапица.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с дюзи, намаляващи отвяването с 90% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при необработваеми земи и пасища.

1.8. Да се използват дюзи, намаляващи отвяването с 90% при необработваеми земи и пасища с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

1.9. Да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностни води с цел опазване на водните организми при следните култури:

- 5 метра при захарно цвекло (при употреба във фенофази BBCH 15-39);

- 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 30% при зърнени култури, маслодайна рапица, патладжан, краставици, корнишони и тиквички;

- 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50 % при бобови култури, моркови, червено цвекло, артишок, кардун, карфиол, главесто и брюкселско зеле, пъпеш, люцерна;

- 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 80% при лозя;

- 20 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 80% при семкови и костилкови овощни култури.

1.10. Да се осигури нетретирана буферна зона до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногит, при следните култури:

- 5 метра при лозя, патладжан, бобови;

- 20 метра при семкови и костилкови овощни култури.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Ограничената и контролирана употреба на посочения продукт да се извърши за срок от 120 дни, считано от датата на издаване на заповедта.

5. Продуктът за растителна защита по т. 1 може да се употребява на територията на цялата страна, при спазване на режимите от заповедите за обявяване на защитените територии и защитените зони от мрежата „Натура 2000“, обявени по смисъла на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

6. Контролът по употребата на посочения продукт за растителна защита по т. 1 се възлага на директорите на областните дирекции по безопасност на храните.

7. На основание чл. 53, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, дирекция Продукти за растителна защита, торове и контрол, към Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните, информира държавите членки и Комисията за предприетата мярка.

На основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за защита на растенията в интернет страницата Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1.

19.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

19.5.2025 г.

X РД11-1453/19.05.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: МАВРИК 2 Ф/ЕВУР 2 Ф
Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
Концентрация на активно/и вещество/а: тау-флувалинат – 240 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Необработваеми площи (вкл. пасища и ливади)	П	Мароканski и италиански скакалци (*Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus*)	Конвен-ционална наземна техника и авиационна техника	При поява на нимфи 1-ва възраст	1	-	60 мл/дка	50 л/дка	14,4 г а.в./дка	-	-
2	Пшеница	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 21-75 (начало на братене – средата на млечна зрелост)	2	10-14	20 мл/дка	20-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	30	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

3	Ечемик, овес, ръж, тритикале	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 10-75 (първи лист от колеоптила - средата на млечна зрялост)	2	14	20 мл/дка	10-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	30	-
4	Маслодайна рапица (зимна и пролетна)	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 10-57 (напълно оформени котиледони-видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразу-ване)	2	14	20 мл/дка	10-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	30	-
5	Захарно цвекло	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15-39 (разлистени 5 листа – листата покриват 90% от повърхността	2	14	20 мл/дка	20-40 л/дка	4,8 г а.в./дка	14	-
6	Фасул, бакла и грах (зелени без шушулки)	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 09-85 за фасул (поникване: хипокотилът с котиледоните пробиват почвената повърхност (фаза на пробиване - 50% от	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	-

					чушките са узрели (зърната са твърди за сортове с ограничен цъфтежен период) за бакла (поникване: кълнът излиза на повърхността на почвата – 50 % от бобовете са узрели и тъмни, семената са сухи и твърди) за грах (поникване: кълнът пробива повърхността на почвата „разпукване“ – 50 % от шушулките са узрели, семената са с крайната си окраска и са сухи и твърди)							

7	Зрял фасул, леща, нахут, посевно секирче (*Lathyrus sativus*) и грах (варива)	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 09-85 (поникване-50% от чушките са узрели, зърната са твърди)	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	14	
8	Моркови, червено цвекло	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	ВВСН 10-49 за моркови (котиледоните напълно разтворени; точката на нарастване или първи несъщински лист видими - край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер) за червено цвекло видими първи листа (като глава на топлийка) котиледоните са хоризонтално разтворени-кореноплодите са в	2	14	30 мл/дка	15-40 л/дка	7,2 г а.в./дка	14	-

					техническа зрялост)							
9	Артишок, кардун	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15-49 (пет листа разтворени – достигане крайния размер на подлежащите за прибиране продуктови части)	2	14	30 мл/дка	10-40 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	-
10	Карфиол, главесто зеле и брюкселско зеле	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени-типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)	1	-	30 мл/дка	10-50 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	-
11	Маруля и други подобни, бейби маруля, ендивия,	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-41 (разтворен втори същински лист – образувана 10 % от листната маса характерна за вариетета)	2	14	40 мл/дка	30-50 л/дка	9,6 г а.в./дка	14	-

12	Патладжан	П	Марокански и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 13-75 (трети същински лист-пети плод с типичен размер и форма)	2	14	20 мл/дка	15-50 л/дка	4,8 г а.в./дка	3	-
13	Краставици, корнишони, тиквички	П	Марокански и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15-84 (пети лист разтворен – 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2	14	20 мл/дка	20-100 л/дка	4,8 г а.в./дка	7	-
14	Пъпеш	П	Марокански и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	2	14	30 мл/дка	50-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	-

15	Ябълка, круша, дюля, мушмула	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	При поява на нимфи 1-ва възраст до BBCH -74 (размер на плода до 40 mm; изправяне на плода)	2	14	20-60 мл/дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	-
16	Праскова, кайсия, нектарина	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	При поява на нимфи 1-ва възраст до BBCH 73 (вторично окапване на завръза)	2	14	20-60 мл/дка	50-150 л/дка	4,8-14,4 г а.в./дка	30	40-120 мл продукт /100 л вода
17	Лозя (трапезни и винени сортове)	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 53-79 (съцветията се виждат изцяло-повечето от зърната се събират, грозда се затваря)	2	14	30 мл/дка	10-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	21	30-300 мл продукт /100 л вода
18	Люцерна	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-72 (разлистени два листа-20% от шушулките са достигнали крайна дължина)	2	14	30 мл/дка	20-100 л/дка	7,2 г а.в./дка	7	Да не се прилага по време на цъфтеж

19	Череши	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	При поява на нимфи 1-ва възраст до BBCH 81 (начало на оцветяване)	1-2	14	20-25 мл/дка	100 л/дка	4,8 – 6 г а.в./дка	14	Не повече от две третирания за вегетационен сезон.
20	Слънчоглед	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвен-ционална наземна техника	При поява на нимфи 1-ва възраст	2	14	20 мл/дка	15-40 л/дка	4,8 г а. в./дка	60	-
21.	Памук, Тютюн	П	Мароканski и италиански скакалци *(Dociostaurus maroccanus; Calliptamus italicus)*	Конвенцион ална наземна техника	При поява на нимфи 1-ва възраст	2	14	40 мл/дка	50 л/дка	9,6 г а.в./дка	7	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

19.5.2025 г.

X РД11-1453/19.05.2025

Приложение № 2
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH401	SP 1 SPe 2 SPe 3

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg