**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

27.5.2025 г.

X РД11-1604/27.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 4131/28.02.2022 г., вх. № 24322/29.12.2022 г., вх. № 24240/23.12.2022 г., вх. № 2678/06.02.2023 г., вх. № 19874/12.10.2023 г. и вх. № 3046/08.02.2024 г. от ,,Адама Агрикалчър БВ", Нидерландия, с упълномощен представител ,,Адама България" ЕООД и писмо с вх. № 8526/11.04.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АВАСТЕЛ ЕК**

Активни вещества: флуксапироксад (fluxapyroxad) - 75 г/л
протиоконазол (prothioconazole) - 150 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Адама Мактешим Лтд., Израел/ Adama Makhteshim Ltd., Israel

Производител на активното вещество флуксапироксад: Адама Мактешим Лтд., Израел/ Adama Makhteshim Ltd., Israel

Производител на активното вещество протиоконазол: БАСФ, Германия/ BASF, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 15 л, 20 л бутилка или контейнер от COEX HDPE/PA

**Специфични изисквания за употреба:**

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми, при пролетни и зимни зърнени култури.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.03.2028 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АВАСТЕЛ ЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АВАСТЕЛ ЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Адама Агрикалчър БВ”, Нидерландия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

27.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

27.5.2025 г.

X РД11-1604/27.05.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **АВАСТЕЛ ЕК**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активни вещества: флуксапироксад (75 г/л), протиоконазол (150 г/л)

| | Култура и/или описание | П О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | (c) | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой Мин/ макс (k) | Интервал между приложен. (мин) | Мл продукт /дка Мин/макс | Вода л/дка Мин/ макс | Г а.в./ дка | (l) | (m) |
| 1. | Зимна пшеница (TRZAW); пролетна пшеница (TRZAS) | П | Листни петна (септория) (*Zymnoseptoria tritici*) (SEPTTR); жълто-кафяви петна (*Drechslera tritici-repentis*) (PYRNTR); жълта ръжда (*Puccinia striiformis*) (PUCCST); кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*) (PUCCRE); брашнеста мана (*Blumeria graminis f.sp. tritici*) (ERYSGT); фузариози по класа (*Fusarium* sp.) (FUSASP) | Механизирана наземна техника | Февруари-юни BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) | 1 | - | 100-125 мл продукт/ дка | 12,5-40 л/дка | 7,5-9,375* + 15-18,75** г а.в./дка | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Зимен ечемик (HORVW); пролетен ечемик (HORVS) | П | Листен пригор (*Rhynchosporium secalis*) (RHYNSE); мрежести петна (*Pyrenophora teres*) (PYRNTE); рамулария (листни петна) (*Ramularia collo-cygni*) (RAMUCC); листна (кафява) ръжда (*Puccinia hordei*) (PUCCHD); брашнеста мана (*Blumeria graminis f.sp. hordei*) (ERYSGH) | Механизирана наземна техника | Февруари-юни BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването) | 1 | - | 100-125 мл продукт/ дка | 12,5-40 л/дка | 7,5-9,375* + 15-18,75** г а.в./дка | - | |
| 3. | Ръж (SECCW) | П | Листен пригор (*Rhyncosporium secalis*) (RHYNSE);жълта ръжда (*Puccinia striiformis*) (PUCCST); кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*) (PUCCRE) | Механизирана наземна техника | Февруари-юни BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) | 1 | - | 100-125 мл продукт/ дка | 12,5-40 л/дка | 7,5-9,375* + 15-18,75** г а.в./дка | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Тритикале (TTLSS) | П | Листни петна (септория) (*Zymnoseptoria tritici*) (SEPTTR); жълто-кафяви петна (*Drechslera tritici-repentis*) (PYRNTR); кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*) (PUCCRE); жълта ръжда (*Puccinia striiformis*) (PUCCST); брашнеста мана (*Blumeria graminis*) (ERYSGR) | Механизирана наземна техника | Февруари-юни BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) | 1 | - | 100-125 мл продукт/ дка | 12,5-40 л/дка | 7,5-9,375* + 15-18,75** г а.в./дка | - | |

Означение: флуксапироксад*, протиоконазол**

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

27.5.2025 г.

X РД11-1604/27.05.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*

| **Класификация** | | **Етикетиране** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Клас и категория на опасност** | **Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност** | **Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)** | **Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност** | **Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност** | **Специфични предпазни мерки за безопасност** |
| Сериозно увреждане на очите, категория 1<br><br>Допълнителна категория за ефекти върху или чрез лактацията<br><br>Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2 | H318<br>H362<br>H411 | GHS05<br>GHS09<br>Опасно | H318<br>H362<br>H411 | EUH401 | SP1<br>SPe3 |

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg