**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

27.5.2025 г.

X РД11-1615/27.05.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42, чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2664/22.05.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 19242/09.10.2023 г., Заявление с вх. № 19954/13.10.2023 г. и писмо с вх. № 6922/24.03.20254 г. от „ФМС Агро България" ЕООД, и писмо с вх. № 7008/25.03.2025 г. и писмо с вх. № 10162/07.05.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **РИЗА 200 ЕК**

   Активно вещество: тебуконазол (tebuconazole) - 200 г/л

   Производител на продукта за растителна защита: Хеминова А/С, Дания/ Cheminova A/S, Denmark

   Производител на активното вещество тебуконазол: Байер КропСайънс АГ, Германия/ Bayer CropScience AG, Germany

   Функция на продукта за растителна защита: фунгицид и растежен регулатор със системно действие

   Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

   Категория на употреба: втора професионална

   Размер и материал на опаковката: 40 мл, 50 мл, 80 мл, 100 мл, 120 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл, 600 мл, 800 мл, 900 мл, 2 л, 3 л, 4 л и 5 л бутилки и туби от HDPE/PA.

**Специфични изисквания за употреба:**

1.1. Да се използва работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака, и лични предпазни средства - защитни ръкавици, гащеризон, здрави обувки и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури 5 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при пролетни и зимни житни култури, зимна рапица, лен, грах и лозя.

1.4. Да се осигури 20 метра растителнозащитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при пролетна рапица.

1.5. Опасен за пчелите/ Да не се използва на места, където има активна паша на пчели./ Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането./ Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху пчели и техните ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г., в срок от 12 месеца от датата на издаването на настоящата заповед.

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

6. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество тебуконазол, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.08.2027 г.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РИЗА 200 ЕК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РИЗА 200 ЕК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

9. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „ФМС Агро България” ЕООД.

10. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

27.5.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

27.5.2025 г.

X РД11-1615/27.05.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **РИЗА 200 ЕК**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активното вещество: тебуконазол - 200 г/л

| | Култура и/или описание | П/О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | © | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин// макс (k) | Интервал м/у прилож. | Мл продукт /дка Мин/ макс | Вода л/дка Мин// макс | Грама а.в./ дка | (l) | (m) |
| 1. | Рапица (зимна) | П | Бели листни петна (*Pseudocercosporella capsellae, Mycosphaerella brassicicola*); черни листни петна (*Alternaria sp*.); листни петна (*Cylindrosporium concentricum*); Бяло гниене (*Sclerotinia sp*.) | Конвенционална наземна техника | BBCH 20-59 (няма странични разклонения-видими първи венчелистчета, цветните пъпки са още затворени) | 2 | 14 | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/дка | 63 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Пшеница (мека, твърда), тритикале, лимец | П | Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*); фузариоза (*Fusarium sp*.); ран листен пригор (*Septoria tritici, S. nodorum*) | Конвенционална наземна техника | BBCH 30-75 (Начало на удължаване на стъблото - средата на млечна зрялост: зърното е с млечно съдържание, зърната са достигнали окончателния си размер, все още зелени) | 1 | - | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/ дка | 35 | |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

27.5.2025 г.

X РД11-1615/27.05.2025

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **РИЗА 200 ЕК**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активното вещество: тебуконазол - 200 г/л

| | Култура и/или описание | П/О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | © | Метод Вид (f-h) | Фази на развитие и сезон (j) | Брой Мин//макс (k) | Интервал м/у прилож. | Мл продукт /дка Мин/ макс | Вода л/дка Мин// макс | Грама а.в./ дка | (l) | (m) |
| 1 | Рапица (зимна) | П | Сухо стъблено гниене (*Leptosphaeria maculans*). Ограничаване растежа на надземните части на растенията | Конвенционална наземна техника | BBCH 20-59 (няма странични разклонения-видими първи венчелистчета, цветните пъпки са още затворени) | 2 | 14 | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/дка | 63 | |
| 2 | Лен | ~~П~~ | Брашнеста мана (*Oidium sp.*); септориоза (*Septoria sp.*); полиспороза (*Kabatiella (Polyspora) lini*) | Конвенционална наземна техника | BBCH 32-55 (стъблото достига 20% от окончателния размер до първи видими цветове) | 1 | - | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/ дка | 63 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ечемик | П | Черна (стъблена) ръжда (*Puccinia graminis*); листен пригор (*Rhynchosporium sp*.); рамулария (*Ramularia collo-cygni*) | Конвенционална наземна техника | BBCH 30-75 (Начало на удължаване на стъблото - средата на млечна зрялост: зърното е с млечно съдържание, зърната са достигнали окончателния си размер, все още зелени) | 1 | - | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/ дка | 35 | |
| 4 | Овес | П | Черна (стъблена) ръжда (*Puccinia graminis*) | Конвенционална наземна техника | BBCH 30-75 (Начало на удължаване на стъблото - средата на млечна зрялост: зърното е с млечно съдържание, зърната са достигнали окончателния си размер, все още зелени) | 1 | - | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/ дка | 35 | |
| 5 | Пшеница (мека, твърда), тритикале, лимец | П | Черна (стъблена) ръжда (*Puccinia graminis*) | Конвенционална наземна техника | BBCH 30-75 (Начало на удължаване на стъблото - средата на млечна зрялост: зърното е с млечно съдържание, зърната са достигнали окончателния си размер,все още зелени) | 1 | - | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/ дка | 35 | |
| 6 | Ръж | П | Черна (стъблена) ръжда (*Puccinia graminis*); листен пригор (*Rhynchosporium sp*.) | Конвенционална наземна техника | BBCH 30-75 (Начало на удължаване на стъблото - средата на млечна зрялост: зърното е с млечно съдържание, зърната са достигнали окончателния си размер, все още зелени) | 1 | - | 125 мл продукт/ дка | 20-40 л/дка | 25 г а.в/ дка | 35 | |
| 7 | Лоза (винени сортове) | П | Черно гниене (*Guignardia bidwellii*) | Конвенционална наземна техника | BBCH 13-79 (третите листа са отворени-повечето зърна се събират, грозда се затваря) | 2 | 14 | 38 мл продукт/ дка | 30-50 л/дка | 7,6 г а.в/ дка | 14 | |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

**Забележки:**

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

X РД11-1615/27.05.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

| *Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Класификация** | | **Етикетиране** | | | |
| **Клас и категория на опасност** | **Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност** | **Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)** | **Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност** | **Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност** | **Специфични предпазни мерки за безопасност** |
| Дразнене на кожата, категория 2<br><br>Кожна сенсибилизция, категория 1<br><br>Сериозно увреждане на очите, категория 1<br><br>Токсичност за репродукцията, категория 2*<br><br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект | H315<br><br>H317<br><br>H318<br><br>H361d<br><br>H412 | GHS05<br><br>GHS07<br><br>GHS08<br><br>Опасно | H315<br><br>H317<br><br>H318<br><br>H361d<br><br>H412 | EUH401 | SP 1<br><br>SPe 3<br><br>SPe 8 |