РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

24.9.2025 г.

X РД11-2872/24.09.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4531/26.02.2021 г. от Байер България ЕООД и писмо с вх. № 17886/08.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МЕРЛИН ДУО ФЛЕКС**
Активни вещества: изоксафлутол / isoxaflutole – 50 г/л
тербутилазин / terbuthylazine – 375 г/л
Антидот: ципросулфамид/ cyprosulfamide – 50 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Байер С.А.С., Франция/ Bayer S.A.S., France

Производител на активното вещество изоксафлутол: Байер АГ, Германия/ Bayer AG, Germany
Производител на активното вещество тербутилазин: Сипкам Оксон СпА, Италия/ Sipcam Oxon SpA, Italy
Производител на антидота ципросулфамид: Байер АГ, Германия/ Bayer AG, Germany

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Размер и материал на опаковката: 100 мл бутилка от COEX HDPE/EVOH; 100 мл; 250 мл, 500 мл и 1 л бутилка от COEX HDPE/EVOH; 100 мл; 250 мл, 500 мл и 1 л бутилка от COEX HDPE/PA; 3 л и 5 л туба от COEX HDPE/PA; 10 л и 15 л контейнер от COEX HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ тербутилазин, повече от веднъж на две години в доза 100 мл продукт/дка (37,5 г а.в. тербутилазин/дка) при „цялостно площно третиране“ с цел опазване на подпочвените води.

1.5. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ тербутилазин, повече от веднъж на три години в доза 150 мл продукт/дка (56,25 г а.в. тербутилазин/дка) при „цялостно площно третиране“ с цел опазване на подпочвените води.

1.6. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ тербутилазин, повече от веднъж на три години в доза 200 мл продукт/дка (75 г а.в. тербутилазин/дка) при „цялостно площно третиране“ с цел опазване на подпочвените води.

1.7. Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ тербутилазин, повече от веднъж на две години в доза 200 мл продукт/дка (75 г а.в. тербутилазин/дка) „лентово приложение върху редовете” с цел опазване на подпочвените води.

1.8. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра, с включена растителнозащитна ивица 10 метра от повърхностни води или нетретирана буферна зона от 10 метра растителнозащитна ивица с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при приложение при царевица в доза 200 мл продукт/дка „цялостно площно третиране“ до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.9. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра, с включена растителнозащитна ивица от 5 метра или буферна зона от 10 метра, с включена 5 метра растителнозащитна ивица с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при приложение при царевица в доза 200 мл продукт/дка „лентово приложение върху редовете” до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.10. Да се осигури растителнозащитна ивица от 10 метра при приложение при царевица в доза 150 мл продукт/дка „цялостно площно третиране“ до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.11. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, с включена растителнозащитна ивица от 5 метра или 5 метра растителнозащитна ивица с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при приложение при царевица в доза 100 мл продукт/дка „цялостно площно третиране“ до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

1.12. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 90% при приложение в доза 200 мл продукт/дка (75 г а.в. тербутилазин/дка) „цялостно площно третиране“ до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.
1.13. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването със 75%, при приложение в доза 150 мл продукт/дка (56,25 г а.в. тербутилазин/дка) „цялостно площно третиране“ до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.
1.14. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването със 75%, при приложение в доза 100 мл продукт/дка (37,5 г а.в. тербутилазин/дка) „цялостно площно третиране“ до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.
1.15. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 50%, при приложение в доза 200 мл продукт/дка (75 г а.в. тербутилазин/дка) „лентово приложение върху редовете“ до неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения.
1.16. Опасен за пчелите/ Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители/ Да не се използва, където има активна паша на пчели / Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използването на **ПРЗ МЕРЛИН ДУО ФЛЕКС** / Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност/ Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество тербутилазин съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.05.2028 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МЕРЛИН ДУО ФЛЕКС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МЕРЛИН ДУО ФЛЕКС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

24.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

24.9.2025 г.

X РД11-2872/24.09.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: МЕРЛИН ДУО ФЛЕКС

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: изоксафлутол / isoxaflutole* – 50 г/л, тербутилазин / terbuthylazine** – 375 г/л

Антидот: ципросулфамид/ cyprosulfamide*** – 50 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод/ Вид	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон	Брой мин/ макс	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс		
	(a)	(b)	(c)	(f-h)	(j)	(k)					(l)	(m)
1.	Царевица (без сладка царевица и царевица за семе)	П	Едногодишни широколистни и житни плевели, вкл. балур от семена	Механизирана наземна техника	BBCH 00-09 (сухо семе - поникване) След сеитба, преди поникване	1 Прилага се веднъж на две години	-	100 мл/дка	25-40 л/дка	5*+37.5**+5*** г а.в./дка	-	

						Прилага се веднъж на три години	-	150 мл/дка	25-40 л/дка	7.5*+56.25**+7.5*** г а.в./дка	-	
						Прилага се веднъж на три години	-	200 мл/дка	25-40 л/дка	10*+75**+10*** г а.в./дка	-	
				Механизирана наземна техника, лентово приложение в редовете		1 Прилага се веднъж на две години	-	200 мл/дка	25-40 л/дка	10*+75**+10*** г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-2872/24.09.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра токсичност, категория 4 Кожна сенсибилизация, категория 1 Токсичност за репродукцията, категория 2 Специфична токсичност за определени органи-повтаряща се експозиция, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H317 H361d H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H302 H317 H361d H373 H410	Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. EUH401	SP1 SPe1 SPe3 SPe8