РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

24.9.2025 г.

X РД11-2874/24.09.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 и чл. 60 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 15699/16.08.2022 г. и вх. № 2465/01.02.2024 г. и писмо с вх. № 19197/27.08.2025 г. от Лаинко С.А., Испания/Lainco, S.A., Spain, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 18850/22.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МИЛСАХ**

Активно вещество: спинозад/spinosad – 480 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Лаинко, С.А., Испания/ Lainco, S.A., Spain
Производител на активното вещество спинозад: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Лаинко С.А./Lainco, S.A., Испания.
Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл; 250 мл; 500 мл и 1 л бутилка от HDPE или COEX; 2 л, 5 л и 10 л туба от HDPE или COEX

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра или 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при късно приложение при лозя до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването със 75% или 20 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% или дюзи намаляващи отвяването с 90% при ранно приложение при лозя до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при приложение при домати, пипер и патладжан до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% при ранно приложение при костилкови и семкови овощни култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.8. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% или 20 метра с включени дюзи намаляващи отвяването със 75% при късно приложение при костилкови и семкови овощни култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.9. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при приложение при листни зеленчуци до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.10. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването със 75 % при приложение при домати, патладжан, пипер и листни зеленчуци на поле до неземеделски земи с цел опазване на неприцелните членестоноги.

1.11. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или дюзи намаляващи отвяването със 75 % при ранно приложение при лозя до неземеделски земи с цел опазване на неприцелните членестоноги.

1.12. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра или 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90 % при късно приложение при лозя до неземеделски земи с цел опазване на неприцелните членестоноги.

1.13. Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90 % при ранно приложение при костилкови и семкови овощни култури до неземеделски земи с цел опазване на неприцелните членестоноги.

1.14. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 90 % при късно приложение при костилкови и семкови овощни култури до неземеделски земи с цел опазване на неприцелните членестоноги.

1.15. Опасен за пчелите./ Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите./ Да не се използва, където има активна паша на пчели./Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането./Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност./Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество спинозад съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.10.2027 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МИЛСАХ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МИЛСАХ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко С.А., Испания/Lainco, S.A., Spain.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

24.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

24.9.2025 г.

X РД11-2874/24.09.2025

Приложение № 1 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: МИЛСАХ

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: спинозад/spinosad – 480 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Лозя (винени сортове) (VITVI)	П	Гроздов молец *(Lobesia botrana)* (POLYBO)	Конвенционална наземна техника	BBCH 53 - 89 (съцветията се виждат изцяло - плодът е готов за беритба) С изключение на фенофаза цъфтеж (при излюпване на яйцата)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	14	

2.	Лозя (десертни сортове) (VITVI)	П	Гроздов молец *(Lobesia botrana)* (POLYBO)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 53 – 89 (съцветията се виждат изцяло - плодът е готов за беритба) С изключение на фенофаза цъфтеж (при излюпване на яйцата)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	14	
3.	Домати (LYPES)	П/О	Памукова нощенка (*Helicoverpa armígera)* (HELIAR) Египетска памукова нощенка *(Spodoptera littoralis*) (SPODLI) Доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)* (GNORAB) Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) (основно BBCH 51-89) (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	

4.	Пипер (CPSAN)	П/О	Памукова нощенка (*Helicoverpa armígera)* (HELIAR), Египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis*) (SPODLI) Доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)* (GNORAB) Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) (основно BBCH 51-89) (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	
5.	Патладжан (SOLME)	П/О	Памукова нощенка (*Helicoverpa armígera)* (HELIAR), Египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis*) (SPODLI) Доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)* (GNORAB) Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) (основно BBCH 51-89) (първо съцветие изправена пъпка-пълна зрялост)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	

6.	Ябълки (MABSD)	П	Ябълков плодов червей *(Cydia pomonella)* (CARPPO)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 71-89 (размер на завръза до 10 мм,следцъфтежно окапване - консумативна зрялост)	1	-	15,8-20 мл/дка	80-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	7	
7.	Круши (PYUCO)	П	Ябълков плодов червей *(Cydia pomonella)* (CARPPO)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 71-89 (размер на завръза до 10 мм,следцъфтежно окапване - консумативна зрялост)	1	-	15,8-20 мл/дка	80-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	7	
8.	Праскови (PRNPS) и нектарини (PRNPN)	П	Източен плодов червей *(Cydia molesta)* (LASPMO)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 31-89 (начало на развитие на леторастите - консумативна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	80-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	7	
9.	Кайсии (PRNAR)	П	Източен плодов червей *(Cydia molesta)* (LASPMO)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 31-89 (начало на развитие на леторастите- консумативна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20	80-100	7,58-9,6	7	

10.	Марули (LACSA)	П	Памукова нощенка (*Helicoverpa armígera*) (HELIAR)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити,нарастващия връх или същинския лист е видим - формирана цялата листна маса)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	40-80 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	
11.	Марули (LACSA) и свежи подправки (вкл. кресон и див кервиз/кервил)	П	Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити,нарастващия връх или същинския лист е видим - формирана цялата листна маса)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	40-80 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	
12.	Рукола (ERUVE)	П	Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити,нараства-щия връх или същинския лист е видим - формирана цялата листна маса)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	40-80 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

24.9.2025 г.

X РД11-2874/24.09.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Лозя (винени сортове) (VITVI)	П	Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 11 - 89 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста-плодът е готов за беритба) С изключение на фенофаза цъфтеж	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	14	

2.	Лозя (десертни сортове) (VITVI)	П	Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 11 – 89 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста-плодът е готов за беритба) С изключение на фенофаза цъфтеж	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	50-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	14	
3.	Праскови (PRNPS) и нектарини (PRNPN)	П	Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 31-89 (начало на развитие на летораститe-консумативна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	80-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	7	
4.	Кайсии (PRNAR)	П	Калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* (FRANOC)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 31-89 (начало на развитие на летораститe-консумативна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	80-100 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	7	

5.	Марули (LACSA)	П	Египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis*) (SPODLI)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити,нараства щия връх или същинския лист е видим - формирана цялата листна маса)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	40-80 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	
6.	Свежи подправки (вкл. кресон и див кервиз/кервил)	П	Памукова нощенка (*Helicoverpa armígera*) (HELIAR) Египетска памукова нощенка *(Spodoptera litoralis*) (SPODLI)	Конвенцио-нална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити,нараства щия връх или същинския лист е видим - формирана цялата листна маса)	1	Да не се извършва повече от едно приложение на вегетационен период срещу всички неприятели	15,8-20 мл/дка	40-80 л/дка	7,58-9,6 г а.в./дка	3	

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.

2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-2874/24.09.2025

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – Остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – Хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1 SPe3 SPe8