РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

24.9.2025 г.

X РД11-2880/24.09.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 1 ал. 2 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 24321/29.12.2022 г. и вх. № 22867/29.10.2024 г. от „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия, с упълномощен представител „ИНС Агро България“ ЕООД, писмо с вх. № 18908/25.08.2025 г. и писмо с вх. № 19214/28.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КОСАР**

Активни вещества: хлорантранилипрол (chlorantraniliprole) - 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Адама Мактешим Лтд., Израел/ Adama Makhteshim Ltd., Israel

Производител на активното вещество хлорантранилипрол: Адама Мактешим Лтд., Израел/ Adama Makhteshim Ltd., Israel

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 1 литър, 5 литра, 10 литра бутилки и туби от HDPE (Полиетилен с висока плътност); 20 литра туби от HDHMWPE (Полиетилен с висока плътност и високо молекулно тегло).

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да не се прилага този или друг продукт съдържащ хлорантранилипрол повече от 1 път на 2 години при главесто зеле, карфиол, броколи (2,8 г а.в/дка), ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарини, кайсии и сливи (3,1 г а.в/дка), с цел опазване на подпочвените води.

1.4. Да се осигури буферна зона от 2 метра с включена 2 метра растителнозащитна ивица при листни зеленчуци и царевица при доза от 2,8 г а.в/дка.

1.5. Да се осигури буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи разпръскването с 50% при лоза при доза от 3,6 г а.в/дка.

1.6. Да се осигури буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи разпръскването с 75% при семкови овощни видове при доза от 3,1 г а.в/дка.

1.7. Да се осигури буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица или дюзи намаляващи разпръскването с 50% при семкови овощни видове при доза от 2,4 г а.в/дка.

1.8. Да се осигури буферна зона от 2 метра с включена 2 метра растителнозащитна ивица при плодни зеленчуци при доза от 4,0 г а.в/дка до повърхностни води с цел опазване на водните организми (за употребите на поле).

1.9. Да не се прилага при дренирани почви с цел опазване на подпочвените води и водните организми при царевица, семкови и костилкови овощни видове.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество хлорантранилипрол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.05.2028 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КОСАР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КОСАР** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия.
9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

24.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

24.9.2025 г.

X РД11-2880/24.09.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **КОСАР**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: хлорантранилипрол - 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а. в./дка	(l)	(m)
1.	Главесто зеле, карфиол, броколи	П	Зелева нощенка (*Mamestra brassicae*), зелев молец (*Plutella xylostella*), бяла зелева пеперуда *(Pieris brassicae),* нощенки (*Spodoptera* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-19 (5 или повече същински листа разтворени - 9 или повече същински листа разтворени) BBCH 20-49 (10 или повече същински листа разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите е достигнат)	1	-	10,5-14	50-80	2,1-2,8	3	

2.	Царевица (за зърно и силаж)	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (Разтваряне на десети лист-физиологична зрялост: в основата на зърната се вижда черна точка/слой съдържанието на сухо вещество е 60%)	1	-	9,5-14	20-70	1,9-2,8	14	
3.	Сладка царевица	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis),* памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (Разтваряне на десети лист-физиологична зрялост: в основата на зърната се вижда черна точка/слой съдържанието на сухо вещество е 60%)	1	-	9,5-14	20-40	1,9-2,8	7	
4.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-59 (съцветията са напълно развити, цветчетата са разедели – край на развитие на съцветията) или 70-83 (формиране на завръз-зърната формират цвят)	1	-	15,5-18	50-120	3,1-3,6	Винени сортове – 30 Десертни сортове - 3	

5.	Ябълки, круши, дюли мушмули	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*), кафявоивичеста ябълкова листозавивачка (*Pandemis heparana*), розена листозавивачка *(Archips rosanus)*, плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 70-87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост)	1	-	15,5 12	60-120 60-100	3,1 2,4	14	
6.	Праскови и нектарини	П	Източен плодов червей (*Cydia molesta*), прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*) кафявоивичеста листозавивачка (*Pandemis heparana*), розена листозавивачка *(Archips rosanus)*, плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива)	1	-	15,5 12	60-120 60-100	3,1 2,4	14	
7.	Кайсии	П	Източен плодов червей *(Cydia molesta*), прасковен клонков молец *(Anarsia lineatella)*, кафявоивичеста листозавивачка (*Pandemis heparana*), розена листозавивачка *(Archips rosanus)*, плодова корогризачка *(Adoxophyes orana)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива)	1	-	12 15,5	60-100 60-120	2,4 3,1	14	
8.	Сливи	П	Кафявоивичеста листозавивачка (*Pandemis heparana*), розена листозавивачка *(Archips rosanus)*, плодова корогризачка *(Adoxophyes orana)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива)	1	-	15,5 12	60-120 60-100	3,1 2,4	14	
9.	Домати и патладжан	П	Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), нощенки (*Spodoptera* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост)	2	7	15,5-20	50-100	3,1-4	1	

10.	Домати и патладжан	О	Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), нощенки (*Spodoptera* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост)	2	7	15,5- 20	50-130	3,1-4	1	15,5- 20 мл продукт/ 100 л вода
11.	Картофи	П	Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*), картофен молец (*Phtorimaea operculella*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 31-60 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират- поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие)	1-2	7	5-6	40-60	1-1,2	14	2 приложения през пролетта 1 приложение, ако се отглежда през есента
12.	Памук	П	Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), *Earia insulana*	Конвенционална наземна техника	BBCH 34-77 (40% от растенията се срещат между редовете – приблизително 70% от семенниците достигат крайният си размер)	1	-	15,5-20	40-60	3,1-4	21	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

24.9.2025 г.

X РД11-2880/24.09.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **КОСАР**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: хлорантранилипрол - 200 г/л

	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а. в./дка	(l)	(m)
1.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	*Cryptoblabes gnidiella, Phyllocnistis vitegenella*	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-59 (съцветията са напълно развити, цветчетата са разедели – край на развитие на съцветията) или 70-83 (формиране на завръз-зърната формират цвят)	1	-	15,5-18	50-120	3,1-3,6	Винени сортове – 30 Десертни сортове - 3	
2.	Ябълки, круши, дюли мушмули	П	Пъстър миниращ молец (*Phyllonorycter blancardella*),	Конвенционална	BBCH 70-87 (размер на завръза до 10	1	-	15,5	60-120	3,1	14	

			ябълков листоминиращ молец (*Phyllonorycter corylifoliella*)	наземна техника	мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост)			12	60-100	2,4		
3.	Круши, дюли мушмули	П	Кръглоиминиращ молец (*Leucoptera malifoliella*) Източен плодов червей *(Cydia molesta*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 70-87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост)	1	-	15,5	60-120	3,1	14	
								12	60-100	2,4		
4.	Нектарини	П	Пъстър миниращ молец (*Phyllonorycter blancardella*), листоминиращ молец *(Phyllonorycter corylifoliella)* сливов плодов червей (*Cydia funebrana)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива)	1	-	15,5	60-120	3,1	14	
								12	60-100	2,4		
5.	Кайсии	П	Пъстър миниращ молец *(Phyllonorycter blancardella),* ябълков листоминиращ молец *(Phyllonorycter corylifoliella)* сливов плодов червей (*Cydia funebrana)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива)	1	-	12	60-100	2,4	14	
								15,5	60-120	3,1		
6.	Праскови и сливи	П	Пъстър миниращ молец *(Phyllonorycter blancardella),* ябълков листоминиращ молец *(Phyllonorycter corylifoliella)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива)	1	-	15,5	60-120	3,1	14	
								12	60-100	2,4		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотокичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

24.9.2025 г.

X РД11-2880/24.09.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасен за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция EUH401	SP1 SPe1 SPe2 SPe3