РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

25.9.2025 г.

X РД11-2896/25.09.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2, чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявления с вх. № 2219/31.01.2023 г., вх. № 22084/18.10.2024 г. от *Синджента България* ЕООД и писмо с вх. № 18377/15.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РИДОМИЛ ГОЛД СЛ**

Активно вещество: металаксил-М / metalaxyl-M 465.2 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария /Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество металаксил-М: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария /Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от HDPE или HDPE/PA и 5 л контейнер от HDPE или f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитна маска/очила по време на смесване/зареждане и приложение, както и гащеризон по време на прилагане на продукта. Съгласно Добрата земеделска практика не се препоръчва повторно влизане преди пълното изсъхване на третираните култури. В случай на повторно влизане в лозя, периодът след третиране е 2 дни, а при зеле е 10 дни.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 на разрешените минимални употреби към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество металаксил-М съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.05.2036 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита РИДОМИЛ ГОЛД СЛ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита РИДОМИЛ ГОЛД СЛ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *Синджента България* ЕООД.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на

основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

25.9.2025 г.

_X_

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

25.9.2025 г.

X РД11-2896/25.09.2025 г.

Приложение №1 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: Ридомил Голд
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: металаксил-М (465,2 г/л)

	Култура и/или описание	П О / З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Лозя (VITVI) (винени и десертни сортове)	П	Мана (*Plasmopara viticola*) (PLASVI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-81 (петите листа са отворени-начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	2	7-10	20 мл продукт /дка	20-100 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	20 дни	В резервоарна смес с продукти, съдържащи единствено фолпет (в концентрация 80 %) в регистрираната им доза

2	Картофи (SOLTU)	П	Мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 11-49 (разтваряне на първите листа на главното стъбло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза)	2	7-10	20 мл продукт /дка	30-60 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	14 дни	В резервоарна смес с продукти, съдържащи единствено мандипропамид 250 г/л, в регистрираната им доза
3	Домати (LYPES)	П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-84 (пети същински лист-40% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2	7-10	20 мл продукт /дка	30-100 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	3 дни	В резервоарна смес с продукти, съдържащи единствено азоксистробин 250 г/л в регистрираната им доза
4	Домати (LYPES)	О	Картофена мана (*Phytophthora infestans*) (PHYTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-84 (пети същински лист-40% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2	7-10	20 мл продукт /дка	30-100 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	3 дни	Самостоятелно или в резервоарна смес с Копрантол Дуо или продукти, съдържащи единствено азоксистробин 250 г/л в регистрираната им доза
5	Луковични зеленчуци (лук (ALLCE), чесън (ALLSA), шалот (ALLAS), батун (ALLFI), пресен/зелен лук, праз (ALLPO))	П	Мана (*Peronospora destructor*) (PERODE)	Конвенционална наземна техника	BBCH 15-49 (пети лист ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух. Растежът е завършил.)	1	-	20 мл продукт /дка	20-80 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	14 дни	В резервоарна смес с продукти, съдържащи единствено азоксистробин 250 г/л в регистрираната им доза

6	Пъпеши (CUMME), дини (CITLA)	П	Мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 21-81 (поява на първо странично разклонение-10% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	2	7-10	20 мл продукт /дка	20-100 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	3 дни	В резервоарна смес с Копрантол дуо в регистрираната доза.
7	Краставици (CUMSA)	П / О	Мана (*Pseudoperonospora cubensis*) (PSPECU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-81 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-10% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	1	-	20 мл продукт /дка	20-100 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	3 дни	Самостоятелно или в резервоарна смес с Копрантол дуо в регистрираната доза
8	Марули (LACSA)	П	Мана (*Bremia lactucae*) (BREMLA)	Конвенционална наземна техника	BBCH 11-49 (разтворен първи същински лист-формирана цялата листна маса)	1	-	20 мл продукт /дка	20-80 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	10 дни	-
9	Главесто зеле (BRSOH), броколи (BRSOK), карфиол (BRSOB)	П	Мана (*Hyaloperonospora brassica*) (HPERBR)	Конвенционална наземна техника	BBCH 11-49 (разтворен първи същински лист-достигнат типичен размер, форма и твърдост на главите)	1	-	20 мл продукт /дка	20-80 л/ дка	9.3 г а.в./ дка	30 дни за зеле и 20 дни за броколи и карфиол	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

25.9.2025 г.

X РД11-2896/25.09.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта: Ридомил Голд
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно/и вещество/а: металаксил-М (465,2 г/л)

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/ дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Марули (LACSA)	О	Мана (*Bremia lactucae*) (BREMLA)	Конвенционална наземна техника	BBCH 11-49 (разтворен първи същински лист-формирана цялата листна маса)	1	-	20 мл продукт/ дка	20-80 л/дка	9.3 г а.в./ дка	10 дни	В резервоарна смес с Копрантол Дуо или продукти, съдържащи единствено азоксистробин 250 г/л в регистрираната им доза.

2	Тревисти растения подправки (група 3HERC)	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвен циона-лна наземна техника	BBCH 15-84	2	7-10	20 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	9.3 г а.в./ дка	3 дни	Самостоятелно или в резервоарна смес с продукти, съдържащи единствено азоксистробин 250 г/л в регистрираната им доза
3	Бейби култури, листно/салатно цвекло, къдрава листна ендивия/ широколистна ендивия, кресон, тревисти растения, градинска салата, тученица, рукола, спанак	П/ О	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвен циона-лна наземна техника	BBCH 11-49	1	-	20 мл продукт/ дка	20-80 л/дка	9.3 г а.в./ дка	10 дни	Самостоятелно или в резервоарна смес с продукти, съдържащи единствено азоксистробин 250 г/л в регистрираната им доза **на поле.** Самостоятелно или в резервоарна смес с Копрантол Дуо в регистрираната доза **в оранжерии.**

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишеситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

25.9.2025 г.

X РД11-2896/25.09.2025 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H302 H319 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H319 H411	EUH401	SP 1