РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

26.9.2025 г.

X РД11-2919/26.09.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 и чл. 60 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4529/15.09.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 18401/03.09.2024 г. и писмо с вх. №18098/12.08.2025 г. от „Синджента България" ЕООД и писмо с вх. № 17884/08.08.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АКСИЕНДО**

Активно вещество: ламбда-цихалотрин (lambda-cyhalothrin) (кандидат за замяна) - 0,015 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Производител на активното вещество ламбда-цихалотрин: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: микроемулсия (ME) – готов за употреба разтвор

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл - 1000 мл контейнер от PET или f-HDPE с пръскаща глава от PP/POM

1 л - 5 л контейнер от PET или f-HDPE с пръскаща глава от PP/PVC и потопена тръба от PP/HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се осигури 10 метра буферна зона, до повърхностни води при: лозя, ягоди, домати, пипер, патладжани, краставици, тиквички, дини пъпеши, тикви, бяло главесто зеле, лилаво зеле, брюкселско зеле, фасул (с и без шушулка), грах (с и без шушулка) и картофи, с цел опазване на водните организми.

1.3. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери по време на използването на ПРЗ. Да не се прилага по време на цъфнала плевелна растителност. Да се премахнат плевелите преди цъфтежа им.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или 5 метра буферна зона с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% до неземеделски земи, при лозя (късно приложение) и патладжани, с цел опазване на нецелевите членестоноги.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи разпръскването с 50% до неземеделски земи, при ягоди, домати, пипер, картофи, фасул и грах, с цел опазване на нецелевите членестоноги.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество ламбда-цихалотрин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.08.2027 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АКСИЕНДО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **АКСИЕНДО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на

разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Синджента България" ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

25.9.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

26.9.2025 г.

X РД11-2919/26.09.2025

Приложение № 1
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта**: АКСИЕНДО**
Формулация: микроемулсия (ME)
Концентрация на активно/и вещество/а: ламбда-цихалотрин (0,015 г/л)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	©	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал м/у прилож	Мл продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а.в./ дка	(l)	(m)
1	Домати	П	Листни въшки *(Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля (BBCH >49)	1	-	66,7	-	1,0	3	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
2	Краставици	П	Листни въшки *(Aphis sp.*)	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля (BBCH >49)	1	-	50	-	0,75	7	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

3	Тиквичка, диня, пъпеш, тиква	П	Листни въшки *(Aphis sp.)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля (BBCH >49)	1	-	50	-	0,75	**7** (тиквичка) 3 (диня, пъпеш, тиква)	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
4	Фасул (с и без шушулки) за консумация в прясна и изсушена форма	П	Листна въшка *(Acyrthosiphon pisum*),	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява	1	-	50	-	0,75	7 (пресен) 14 (сушен)	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
5	Грах (с и без шушулки) за консумация в прясна и изсушена форма	П	Листна въшка *(Acyrthosiphon pisum*),	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява	1	-	50	-	0,75	7 (пресен) 14 (сушен)	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
6	Картофи	П	Колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata*), Листни въшки *(Aphis sp.*), Оранжерийна картофена листна въшка *(Aulacorthum solani*), Картофена листна въшка *(Macrosiphum euphorbiae*), Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae*),	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При първа поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	7	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

26.9.2025 г.

X РД11-2919/26.09.2025

Приложение № 2
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Търговско наименование на продукта**: АКСИЕНДО**
Формулация: микроемулсия (ME)
Концентрация на активно/и вещество/а: ламбда-цихалотрин (0,015 г/л)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож.	Мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Г а.в./дка	(l)	(m)
1	Лозя	П	Лозова бълха *(Altica lythri)*, Лозова листозавивачка *(Sparganothis pilleriana*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При първа поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	14	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
2	Ягоди, патладжан, марули	П	Ларви на подземна нощенка/сиви червеи *(Agrotis sp.)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля	~~1~~	-	50	-	0,75	14 (маруля) 3 за останалите	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

3	Краставици	П	Трипси *(Thrips sp.)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	7	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
4	Бяло главесто зеле, лилаво зеле, брюкселско зеле	П	Бяла зелева пеперуда *(Pieris brassicae*), Зелев молец *(Plutella xylostella)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	3	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
5	Фасул (с и без шушулки) за консумация в прясна и изсушена форма	П	Бобова огневка *(Etiella zinckenella)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	7 (пресен) 14 (сушен)	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
6	Грах (с и без шушулки) за консумация в прясна и изсушена форма	П	Грахова листозавивачка *(Cydia nigricana)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	7 (пресен) 14 (сушен)	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)
7	Картофи	П	Картофен молец *(Phthorimaea operculella)*	Ръчен апликатор за пръскане на открито	При поява на неприятеля	1	-	50	-	0,75	7	Да не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта.
2. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра токсичност (орална), категория 4 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H411	EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция EUH401	SP1 SPe3 Spe8